FIRMA DE WILDE

BUSSUM

„La Gracieuse"

D. SMIT
Gijsbr. van Aemstelstr. 237
HAARLEM-N.

Roos Theehybride „La Gracieuse"

Uit een kruising van „Comtesse Vandal" (koperrose) met de donkerrode „Matador" verkreeg wijlen de Heer G. A. van Rossem te Naarden een nieuwe variëteit, welke hij niet meer in de handel kon brengen, omdat hij zijn kwekerij, bij gebrek aan een opvolger, moest liquideren. Daar de Heer van Rossem deze roos niet graag verloren zag gaan, verzocht hij ons, nu vier jaar geleden, zijn zaailing No. 829 over te nemen en verder te kweken onder de naam „La Gracieuse". Inmiddels hebben wij enige duizenden struiken van deze roos gekweekt en kan vanaf half October de aflevering beginnen, zodat reeds het volgend jaar ook in Uw tuin „La Gracieuse" niet behoeft te ontbreken en U zult kunnen genieten van haar kleur en heerlijke geur.

De struiken van „La Gracieuse" groeien sterk rechtop. De jonge scheuten zijn rood gekleurd met slechts weinig grote doorns. Het blad is donkergroen en niet bijzonder gevoelig voor meeldauw, blackspot en roest. De lang gestrekte, zeer elegante bloemknoppen openen zich tot grote, volmaakt gevormde, niet geheel gevulde bloemen met grote bloembladeren, welke enige dagen goed blijven. Haar kleur is fraai karmijnrose, aan de voet overgaand in boterbloemgeel. De zeer sterke, echte rozengeur is één harer voortreffelijkste eigenschappen. Enkele, zich openende knoppen, in de vroege ochtend gesneden, zullen het vertrek, waarin U ze plaatst, met een geur vervullen als weinig andere.

Wij adviseren deze roos te planten op een open, zonnige plaats, niet tegen een huis of schutting, waar het brandend heet kan zijn. Goede, voedzame grond, welke bovendien goed vochthoudend moet zijn, is beslist nodig. Zie hiervoor pag. 4 onzer catalogus. Niet in vereniging met andere rozen, doch afzonderlijk in een vak, rand of groep, zullen de bijzondere eigenschappen van „La Gracieuse" ten volle tot hun recht komen.

„La Gracieuse" werd onder No. 829 bekroond met een getuigschrift van verdienste en een jaar later met een getuigschrift eerste klasse van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde.

L. S.,

Deze uitgebreide catalogus, welke behalve ons gehele assortiment Rozen en Vruchtbomen, tevens een beknopt overzicht geeft van de verzorging, welke deze diverse soorten behoeven, verzoeken wij U zorgvuldig te bewaren.

In het vervolg zullen wij jaarlijks een geheel nieuwe prijslijst doen uitkomen, welke aansluit op deze catalogus. In deze prijslijst zullen wij slechts de nieuwe aanwinsten uitvoerig beschrijven, alsmede enige kleurenfoto's opnemen.

Aangezien wij niet alle door ons gekweekte rozen (nieuwe variëteiten) in kleuren kunnen afbeelden, blijft een bezoek aan onze kwekerijen immer aan te bevelen. Van Juni tot October zijn onze kwekerijen voor bezoek geopend van 9-12 en van 13-17 uur; des Zaterdags van 9-12 uur.

Hoogachtend,
Firma E. R. de Wilde.

Kwekerijen en kantoor: Koedijklaan 25, Bussum.
Telefoon 02959-2710.
Postgiro: No. 76661.

ROZEN

De beste tijd om rozen te planten in van half October tot eind November en van eind Februari tot eind April. Op zeer laag gelegen gronden is het beter alleen in het voorjaar te planten.

Wanneer men bij aankomst van een zending niet direct kan planten, kuilt men de rozen tijdelijk in, 't liefst niet te dik en op een tochtvrije plaats. Men kuilt de rozen tot de helft van het bovenaardse gewas in.

Mocht een zending rozen aankomen bij vorstig weer, dan legt men ze onuitgepakt op een koele vorstvrije plaats neer, bijv. in een kelder, tot het dooiweer wordt. Heeft men een vorstvrije ruimte beschikbaar, waarin men kan kuilen (bijv. koude kas of schuur zonder vloer), dan kuilt men bij aanhoudend vriezend weer de rozen daarin op. De rozen ingepakt overbrengen.

De grondbewerking voor rozen komt in 't kort op 't volgende neer: Rozen houden van een diep losgemaakte, voedzame grond. Hooggelegen zandgronden vermenge men met doorvroren bagger of klei. Tevens moet voor een flinke hoeveelheid stalmest gezorgd worden. Verteerde koemest is voor deze gronden wel het beste. Men geeft ongeveer 1 goed beladen kruiwagen per 4 m^2. Vaak ziet men op hoge gronden gebruik maken van bladaarde; de resultaten zijn meestal slecht. Het optreden van allerlei ziekten is dikwijls het gevolg; reden waarom we menen dit te moeten ontraden.

Stijve kleigronden vermengt men met grof zand en ruige koe- of paardenmest, de laatstgenoemde is voor deze grondsoort het beste; deze maakt de grond wat luchtiger. Veengronden verbetert men door er grof zand en doorvroren klei doorheen te mengen, benevens een flinke hoeveelheid stalmest (paardenmest, varkensmest). Ligt de grond laag, dan kan een drainerende laag nodig zijn, bijv. op 60 cm diepte een laagje sintels aanbrengen, ter dikte van ± 10 cm. Grof tuinafval, takken enz. kunnen voor dreinage geen dienst doen; na enkele jaren is dit alles verrot en zakken de perken, zodat het tegendeel bereikt is. Indien er geen harde lagen in de bodem aanwezig zijn, is het losmaken tot op 60 cm voldoende. Moet een rosarium of een enkel rozenperk vernieuwd worden, dan is het nodig de aarde tot op 50—60 cm diepte er uit te kruien en door nieuwe, goede grond te vervangen.

De mest moet altijd zo met de grond vermengd worden, dat ze nimmer direct met de wortels in aanraking komt.

Het bemesten der rozen is een jaarlijks terugkomende werkzaamheid. Men gebruikt in hoofdzaak stalmest, welke men direct, nadat de rozen met grond zijn aangeheuveld, in Nov.-Dec. er tussen strooit. De mest wordt dan met de grond, welke men in het voorjaar van de rozen afhaalt, gedekt. Ook hiervoor is halfverteerde mest de beste niet alleen, doch ook gemakkelijker onder te werken. Tevens geeft men nog 100—125 gram Thomasslakkenmeel

Beauté.

of 100 gram superfosfaat, 75 gram patentkali en 50 gram zwavelzure ammoniak of kalkammonsalpeter per m^2. Thomasslakkenmeel in Januari uitstrooien, de andere meststoffen in Maart.

Na de eerste bloei geeft men de rozen nog eens een **overbemesting** met verdunde koemest: 1 deel koemest op 3 delen water; 't liefst doet men dit op een regenachtige dag, zodat ze in de grond zakt. In plaats van koemest kan men ook geven Chilisalpeter of kalksalpeter en wel 30 gram per m^2; dit moet men enige keren herhalen met een tussentijd van $\pm$ 14 dagen. Tegelijkertijd geeft men ook een 40—50 gram superfosfaat, zorgende dat deze kunstmeststoffen niet op de bladeren komen. Tegenwoordig heeft men zeer goede samengestelde meststoffen, o.a. de bekende A.S.F.-korrels. Deze zijn chloorvrij en gemakkelijk tussen de planten uit te strooien. De A.S.F.-korrels zijn in verschillende verhoudingen verkrijgbaar. Rozen houden het meest van de verhouding 12 $\times$ 15 $\times$ 18, waarvan men 50 gram geeft per m^2. In het laatst van Juli geeft men dan nog 1 maal de genoemde hoeveelheid korrels. Na half Augustus niet meer bemesten, omdat anders de scheuten voor de winter niet rijp worden, dus vatbaarder blijven voor vorst. Maar al te dikwijls worden rozen geplant met het doel een tuin te bezitten, waar men niet meer naar behoeft om te zien. Van dergelijke rozen beleeft men nimmer plezier. De koningin der bloemen moet men ook als zodanig behandelen, men wordt daarvoor dan ook koninklijk beloond met een schat van bloemen.

Bij het **planten van rozen** zorge men er voor, dat de daartoe bestemde vakken klaar zijn, zodat direct na aankomst der rozen geplant kan worden. Mochten de wortels der rozen enigszins droog zijn, dan giet men ze flink nat of men legt ze een paar uren in water. Ze worden echter wel zo verpakt, dat van droog worden in het pak geen sprake is. Uitpakken der rozen doet men op een tochtvrije plaats. Gekneusde wortels snijdt men tot het gezonde deel in. Aan het bovenaardse gewas snoeit men niet, tenzij men in 't voorjaar plant (Maart—April). **Plantafstand** der struiken 40—45 cm.

Men maakt ruime, diepe plantgaten en plaatst de roos daar zo in, dat het veredelde gedeelte, dit is waar de takken ontstaan, 3—4 cm onder de grondoppervlakte komt. Stamrozen nooit dieper planten, dan ze in de kwekerij stonden, wat te zien is aan de donkere kleur onder aan de stam. Tijdens het aanvullen der plantgaten trapt men de grond stevig aan. In 't voorjaar op droge gronden tevens flink aangieten. Rozen, welke in de herfst worden geplant, moet men meteen dekken. Hoe, daarover later.

Rozen houden van een ruime **standplaats**, zij mogen niet geplant worden daar, waar hoge bomen of schuttingen het zonlicht onderscheppen, zoals dit dikwijls in stadstuinen het geval is. Een beschutting tegen koude noordelijke of oostelijke winden is zeer goed.

Pas geplante rozen moeten in het voorjaar bij aanhoudende droogte steeds worden natgehouden, alsook rozen, die reeds langer

stonden op hoge grond. Niet alleen het bovenlaagje moet vochtig zijn, doch men overtuigt zich of de ondergrond wel goed nat is. Ook tijdens de zomer moet daar steeds op worden gelet. Het is beter 2 maal per week goed te sproeien, dan elke avond een beetje; dit water verdampt zonder dat de plant er iets aan heeft. Tijdens de bloei der rozen niet over de planten gieten; men bezoedelt dan de bloemen. Na 't gieten de bovengrond los schoffelen, dit voorkomt verdamping, omdat de dunne droge laag met waterdamp verzadigd raakt.

Snoei. Veelal ziet men, dat pas geplante rozen veel te lang worden gesnoeid. Dit geeft niets dan teleurstelling. Pas geplante rozen snoeit men onvoorwaardelijk kort in, d.w.z. op 3—5 ogen (5—10 cm). In het najaar geplante rozen, alsook vaststaande, worden in Maart gesnoeid. Rozen, welke vast staan, snoeit men, voorzover het laag groeiende en bloeiende variëteiten betreft, op 2—3 ogen in; sterker groeiende op 5—7 ogen. Rankende Thee- en Noisetrozen op 50—75 cm lengte, omdat deze hun bloemen geven op de langere takken. Klimrozen en treurrozen snoeit men niet, d.w.z. men snijdt het uitgebloeide oude hout er uit, doch laat alle jonge takken zitten. Kort gesnoeide rozen geven krachtige scheuten met flinke bloemen. Pas geplante klimrozen snijdt men tot op $^1/_3$ in; in het voorjaar is korter insnijden gewenst. De zomersnoei bepaalt zich alleen tot het uitnemen der uitgebloeide bloemen met ten hoogste één blad. Soms ziet men dat lange scheuten in de zomer worden ingekort, omdat men ze lelijk vindt; dit moet ten zeerste ontraden worden. **Met het blad neemt men als het ware de longen der planten weg, zodat ook het bloemen snijden met lange stelen absoluut schadelijk is voor rozen.** Beter is het hiervoor een hoekje apart te zetten in de moestuin; kan men dat niet, snijd dan nooit met lange stelen, in geen geval van stamrozen.

Verwijder steeds eventuele wilde scheuten van stam-, struik- en klimrozen. Te herkennen aan de kleur en het meestal veel kleinere blad.

Over het al of niet dekken van rozen in de winter kan men van mening verschillen. De veiligste weg is, dit werk niet na te laten, daar het genoegzaam gebleken is, dat het in ons land vriezen kan. Zeker, het is niet goed om overdreven vroeg te dekken, maar toch wachte men niet langer dan November, vooral niet, als men de rozen in de grond wil buigen; dan kan een vroeg invallende strenge vorst zulks beletten, omdat de grond te hard wordt.

Waar het mogelijk is, blijft genoemde methode van dekken de voorkeur verdienen boven zovele andere. Struikrozen worden aangeheuveld met grond uit het vak; stamrozen worden, na bij de stam de grond wat los gemaakt te hebben om breken te voorkomen, met de kroon in de grond gebogen. Vooraf dient men blad en eventueel onrijp hout er uit te halen. Is in de grond

buigen onmogelijk, dan inpakken in stro, sparregroen, papier of iets van dien aard. **Turfmolm mag voor dekking niet worden aangewend.** Zeer vaak worden rozen niet gedekt en dikwijls met goed gevolg. Er zijn echter gevallen bekend, dat alle rozen in een tuin bevroren, zodat dekken het meest afdoende is.

Ontdekken doet men bij goed weer in Maart, liefst niet bij schrale wind; als 't kan op een regenachtige dag.

Ziekten en beschadigingen kan men bij enige oplettendheid grotendeels voorkomen.

Meeldauw ('t wit), **roest** en **blackspot** ('t zwart) zijn de meest gevreesde ziekten.

't Wit bestrijdt men als volgt: men spuit in Mei met spuitzwavel ter sterkte van ½%. Vanaf half Juni kan men gebruik maken van ventilatozwavel (bloem van zwavel), welke men er zeer dun overheen stuift. Niet wachten tot men meeldauw ziet.

Tegen roest en blackspot spuit men vóór het uitlopen der rozen met Bordeauxse pap ter sterkste van 1½—2%. Het jonge loof met 1%. Ziet men in Mei—Juni menierode puistjes aan de onderzijde der bladeren, dan plukt men deze bladeren af en verbrandt ze; men voorkomt daarmede erger. Later in de zomer ziet men dikwijls een menigte oranjerode stipjes, welke in de herfst worden vervangen door zwarte; dit zijn de wintersporen.

Hiertegen is weinig meer te doen. Afgevallen blad vergaren en verbranden, vóór het dekken de rozen op de grond spuiten met 3% Bordeauxse pap (recept Bord. pap op bladzijde 60).

Bladluizen bestrijde men door een bespuiting met 0.1% nicotine van 95—98%, of met een Parathion-houdend middel, waarmede men ook rupsen en bastaardrupsen kan doden. Sterkte wordt door de fabrikant aangegeven, daar dit afhankelijk is van het parathiongehalte. Tegen het openen der bloemen niet spuiten, om ze niet te bezoedelen.

Tegen de vreterij van rupsen en bastaardrupsen spuit men in de voorzomer enige keren met ½% loodarsenaat, dus 5 gram op 1 liter water, of met D.D.T. Alles wat aan de rozen vreet is dan ten dode opgeschreven.

ROZEN: De fijnste en voordeligste tuinbeplanting!
De levensduur van goed onderhouden rozen is 10-20 jaar.

SOORTEN EN VARIËTEITEN.

Bij het verschijnen van deze catalogus zijn vele variëteiten reeds uitverkocht. Het is daarom gewenst reeds vroeg te bestellen om zodoende teleurstelling te voorkomen.

Stamrozen zijn verkrijgbaar in de volgende variëteiten:

Betty Uprichard	*New Yorker*
Ena Harkness	*Opéra*
General Mac Arthur	*Peace*
	Sutter's Gold
Lady Sylvia	*The Doctor*
	Virgo

Voorts wijzen wij er op, dat al onze rozen uitsluitend op Rosa canina worden gekweekt, zodat ze een langere levensduur hebben.

Tevens wordt door een doelmatige bemesting gezorgd, dat het hout goed hard is voor de leveringstijd aanbreekt, zodat onze rozen zelfs bij strenge vorst hoegenaamd niet invriezen.

ROSA INDICA FRAGRANS (THEEROZEN).

Theerozen verlangen een goede bedekking in de winter. De kortgroeiende worden kort, de rankende theerozen worden lang gesnoeid. De rankende worden meest gebruikt als klimroos of als vrijstaande rozen.

Gloire de Dijon *(Jacotot 1853)*. Abrikoosgeel, sterke theeroos, vooral als klimroos. Geurend.

Maréchal Niel *(Pradel 1865)*. Een zeldzaam mooie theeroos, welke een warme standplaats verlangt. Een enkele keer treft men in kassen een exemplaar aan. Dat is dan wondermooi. Haar kleur is donkergeel. Heerlijk geurend. Klimroos.

Mme J. Gravereaux *(Soupert & Notting 1900)*. Zeer grote, geel met perzikrose gekleurde bloem. Klimroos.

ROSA INDICA FRAGRANS HYBRIDEN (HYBRIDE THEEROZEN).

Tot deze groep behoren de meeste snij- en perkrozen; ze zijn ontstaan uit kruisingen van Thee- en Remontantrozen. Ook de Rosa Pernettiana hybriden kunnen tot deze klasse gerekend worden. Zij zijn beter tegen vorst bestand dan de Theerozen, maar hebben toch bedekking nodig. De snoei is voor het merendeel kort.

ARMONIA *(Cazzaniga 1951)*. Een aantrekkelijke, vuurrode, goud getinte roos met sterke geur; op stevige takken en rijk bloeiend!

BIG DADDY *(Breedlove Nurseries 1955)*. De sterk groeiende struiken, met stevige lange takken, brengen grote, goed gevulde, roserode geurende bloemen voort, welke in knop iets donkerder en fluweelachtig zijn. Als kruisingsproduct van Crimson Glory ×Texas Centennial heeft ze alle goede eigenschappen van beide ouders in zich verenigd. Jonge scheuten en blad bronsrood, ouder blad bronsgroen en sterk glimmend.

BYADÈRE *(Mallerin 1953)*. Gezonde, sterk groeiende variëteit. Lange, mooi gevormde knoppen. Geopende bloemen zeer goed gevuld en zalmrose van kleur, met kanariegele nuance. Versprei-

den een heerlijke theerozengeur. Bekroond met zilveren medaille te Genève 1952 en in 1954 gouden medaille N.R.S.

BUCCANEER *(Armstrong Nurseries 1952)*. Middelmatig grote, urnvormige knoppen. Meloengele, goed gevulde bloemen met theerozengeur. Goede groeier, gezond blad.

BEAUTÉ *(Mallerin 1953)*. Deze buitengewoon mooie roos heeft lange, sierlijke knoppen, abrikooskleurig rood, bij het verbloeien geel genuanceerd. De sterk groeiende, gezonde struiken vormen stevige scheuten.

BINGO *(Ilgenfritz Nurseries 1955)*. Onder de nieuwe rozenvariëteiten trekt deze wel speciaal de aandacht door haar grote, goed gevulde, heerlijk geurende, kardinaalrode bloemen. Haar sterke groei en rijke bloei zullen deze roos ongetwijfeld de plaats bezorgen, welke haar toekomt.

BURNABY *(Eddie & Sons 1955)*. Kruising van Phyllis Gold × Pres. H. Hoover. De lange, puntige knoppen zijn zacht geel, de geopende bloemen, welke zeer goed gevuld zijn, zijn meer crêmekleurig en een weinig geurend. De struiken groeien matig. Ze behaalden in 1954 het proeftuincertificaat en de gouden medaille van de N.R.S.

Chief Seattle *(Armstrong Nurseries 1951)*. De zeer goed gevulde bloemen hebben een garnaalrose kleur, welke met het verbloeien naar het strogeel overgaat. Groeit sterk en gezond. Get. v. Verd. Rome 1951.

Charles Mallerin *(F. Meilland 1957)*. De kleur der grote, goed gevulde, onberispelijk gevormde bloemen is vlammend donkerfluweelrood van een ongekende schoonheid. Ze verspreiden een verrukkelijke geur, welke men bij de meeste rozen tevergeefs zoekt. Struiken groeien goed en vormen flinke takken. Bekroond met certificaat S.N.H.F. 1947 en cert. „La Plus Belle Rose de France 1957".

Condesa di Sastago *(P. Dot 1932)*. Rijkbloeiende roos, waarvan de hoofdkleur oranjerood is met geel aan de buitenkant der bloemblaadjes, zeer opvallend. Bladeren lichtgroen, glimmend, Sterke groeier.

DOWNLAND LUSTRE *(Ratcliffe 1955)*. Een laagblijvende, rijk bloeiende roos. Spitse, goudgele knoppen, welke bij het openen maisgeel worden en kruidachtig geuren. Glimmende, bronsgroene bladeren.

Diamond Jubilee *(Jackson & Perkins 1947)*. Kruising van Maréchal Niel × Feu Pernet Ducher. Deze gezonde, flinke groeier brengt grote, ovaal gevormde, gevulde knoppen voort, welke licht bruingeel van kleur zijn en de echte theerozengeur bezitten.

DUO *(J. Gaujard 1956)*. De struiken met hun matrode takken en bronsgroene bladeren brengen bloemen voort, zo uitzonderlijk schoon van kleur, als slechts weinig andere. De eironde knoppen openen zich tot half gevulde, lang houdbare bloemen met gefranjerde bloemblaadjes, waarvan de vermiljoenrode kleur met

Buccaneer.

koperrode nuance van verre reeds opvalt. Een zeer aparte variëteit met heerlijke geur.

Etoile de Hollande *(H. A. Verschuren 1920)*. Een der mooiste donkerrode perkrozen, geurt heerlijk. Groeit en bloeit goed.

Ena Harkness *(Norman 1946)*. Zeer mooie donkerrode roos met warme gloed, verbrandt niet en wordt niet blauw; behoudt haar aantrekkelijke kleur, totdat de bloembladeren afvallen. Heerlijk van geur en rijkbloeiend; één der beste rode snij- en perkrozen. Goede groeier. Zeer aan te bevelen.

EUGENIO FOJO *(Pedro Dot) 1953)*. De compact groeiende struiken brengen overvloedig koraalrode, naar rose overgaande bloemen voort, welke matig gevuld zijn. Opvallend mooi.

FAVORITA *(Stark Bros. Nurseries 1955)*. Uit de eivormige knoppen ontwikkelen zich zeer goed gevulde, geurende bloemen, welke oranje-bruin van kleur zijn, overgaand in zalmrood, dat bijna niet verkleurt. De struiken geven krachtige, sterk bedoornde scheuten. Een zeer goede aanwinst.

FIRST LOVE *(Armstrong Nurseries 1950)*. Zelden zagen wij een roos met zulke elegant gevormde knoppen als deze nieuwe variëteit. De lichtrose, zalmkleurig genuanceerde bloemen, welke op lange, stevige takken worden gedragen, openen zich langzaam en zijn fijn geurend. Struiken groeien goed.

FRIVOLITÉ *(Pedro Dot 1956)*. Het jonge blad van de sterk groeiende struiken is geel-groen van kleur, later mat-groen. Hierop komen de grote, goed gevulde, zalm-oranjerode bloemen zeer goed uit. De struiken bloeien de gehele zomer en laten ons van de zeer bijzondere kleurencombinatie aanhoudend genieten. Het is een kruising van Peace × Catalonia.

General Mac Arthur *(J. G. Hill 1905)*. Een zeer goede, scharlakenrode perkroos met heerlijke geur. Bloemen goed gevuld, bloeit zeer rijk.

GAY LADY *(Breedlove Nurseries 1955)*. De geurende, lichtrode tot rose bloemen zijn groot, goed gevuld en edel van vorm. De struiken zijn getooid met leerachtig, gezond blad.

HENRI MALLERIN *(Mallerin 1953)*. De fraai gevormde, warm gele, goed gevulde bloemen staan op sterke stelen. De knoppen zijn koraalrood genuanceerd. De planten zijn getooid met sterk, hard, glimmend, groen blad en bloeien zeer rijk. Eén der mooiste gele rozen.

HENRY FORD *(Howard & Smith 1954)*. Ontstaan uit een kruising van Pink Dawn × The Doctor, doet zeer sterk aan The Doctor denken. Haar grote, goed gevulde, geurende bloemen zijn zuiver rose van kleur. Haar puntige, lange knoppen zijn fraaier dan van The Doctor.

HANDSOM RED *(The Brownells 1954)*. De compact groeiende struiken brengen fluwelig helderrode, goed gevulde bloemen voort, welke vooral in knop fraai gevormd zijn. Verkleuren niet spoedig. Een zeer mooie perkroos. Geurend.

Bingo 1957.

JOSEPHINE BRUCE *(Bees 1954)*. Met haar grote, zeer goed gevulde fluwelig karmijn- tot scharlakenrode, heerlijk geurende bloemen behoort deze roos tot een der beste rode variëteiten van de laatste jaren. Haar flinke groei is een waarborg voor rijke bloei. Het donkergroene, grote blad vult de gehele struik, doch lijkt ons gevoelig voor meeldauw.

Julia *(Giocomasso 1950)*. Van deze rijkbloeiende verscheidenheid contrasteren de geel-rose, niet bijzonder grote bloemen opvallend tegen het helder groene, sterke, glimmende blad.

LA GRACIEUSE *(G. A. van Rossem 1957)*. Zie voor beschrijving bij de kleurplaat.

LONDON PRIDE *(Ratcliffe 1954)*. De edel gevormde, flinke bloemen zijn zalmrose met koraalkleurige nuance. Geurend. Gezonde, sterke groeier.

LYDIA *(H. Robinson 1951)*. Zeer mooie saffraangele, goed gevulde bloemen, welke niet verkleuren. De knoppen vallen erg op door een enkele karmijnrode streep. Helder groen, glimmend blad. Sruiken groeien compact en bloeien steeds door.

Lady Sylvia *(W. Stevens 1927)*. Een roos met dezelfde goede eigenschappen als de Mme Butterfly, waarvan het een sport is. De kleur der bloemen is echter meer zuiver rose.

LOVE SONG *(Conard-Pyle Co. 1955)*. De beste tweekleurige roos, welke wij tot dusver zagen. De edel gevormde, alleenstaande bloemen worden door sterke scheuten gedragen en zijn zeer goed gevuld. De binnenkant der bloemblaadjes is oranjerood tot zalmrose, de buitenkant geel met oranje. Het is een zaailing van de bekende Peace en bezit dan ook dezelfde goede eigenschappen van die variëteit, zoals zeer goede groei, rijke bloei en zeer goed gezond.

Minerve *(F. Meilland 1947)*. Kleur der gevulde, mooi gevormde bloemen is citroengeel met een karmijnrode schakering. Zacht geurend. Goede perkroos.

Mme Edouard Herriot *(Pernet-Ducher 1913)*. Ook bekend als Daily-Mail roos. Matig grote, half gevulde, koraalrode roos. Helder glimmend blad. Alleen als stam- en klimroos.

MIGUEL ALDRUFEU *(Pedro Dot 1955)*. De lang houdbare, grote, zeer goed gevulde bloemen hebben een prachtige zalmrose kleur met een weinig geel aan de voet der bloemblaadjes. Ze geuren fijn en worden door stevige scheuten gedragen. Een zeer mooie en waardevolle nieuwe roos.

MAYET *(Pedro Dot 1952)*. Compact groeiende planten, welke regelmatig karmijnrode bloemen voortbrengen, die goudkleurig genuanceerd zijn. Sterk geurend en lang houdbaar. Klein olijfgroen blad.
Prijs per stuk *f* 2.—; per 10 stuks *f* 19.—.

MARDI GRAS *(Jackson & Perkins 1953)*. De fraaie, puntige knoppen ontplooien zich tot donker fluweelrode, grote, goed gevulde bloemen. Fijn geurend. De struiken groeien sterk, zijn gezond en brengen veel bloemen op sterke, rechte stelen voort.

MARGARET *(Alex Dickson & Sons 1954)*. Een wel zeer opvallende, fraaie lila-rose roos. De edel gevormde knoppen openen zich langzaam, doch zeer goed, ook bij regenachtig weer, tot zeer grote bloemen, welke zacht geuren. De planten groeien krachtig en zijn kerngezond, dicht bezet met bronsgroen blad. Takken en stekels fraai rood. Gouden medaille N.R.S. 1954.

Mission Bells *(Germain Seed & Plant Co. 1949)*. Deze rijkbloeiende struik prijkt met warm zalmrode puntige knoppen, welke met het openen aan de voet der bloemblaadjes een oranjeachtige schakering tonen. De bronsgroene tint der bladeren verhoogt het kleureffect der bloemen.

Mrs. Sam. Mac Gredy *(Sam. Mac. Gredy & Son 1929)*. Uit de vele rozenvariëteiten valt deze in het bijzonder op. De koperachtig oranjerode bloemen zijn van volmaakte vorm. Jonge scheuten en bladeren opvallend rood van kleur. De planten groeien goed en voldoen als perkroos ten zeerste.

New Yorker *(Jackson & Perkins 1947)*. Het jonge loof is donker

getint. De mooi gevormde, goedgevulde bloemen zijn fluweelachtig scharlakenrood; worden niet blauw. De knoppen hebben een mooie puntige vorm. Bekroond met Goude Medaille op de Internationale Rose Test Gardens te Portland. Get. v. Verd. K.N.M. v. Tuinb. en Plantk. 1951.

Opéra *(Gaujard 1950)*. Elegant gevormde knoppen, die bij het openen hun bijzonder mooie, helderrode kleur ten toon spreiden, welk effect nog verhoogd wordt door de gele gloed onder aan de bloemblaadjes. Deze halfgevulde bloemen komen op het helder lichtgroene blad goed tot hun recht.

Paramount *(Paramount 1951)*. De compact groeiende struiken met hun lichtgroene bladeren tooien zich met zalmoranje, puntige knoppen, welke bij het openen zalmrose worden. Een sterke en gezonde roos. Get. v. Verd. K.N.M. v. T. en Pl.

PINK PERFUME *(Herbert Robinson 1954)*. Fraaie puntige knop. De geopende bloem is goed gevuld, geurt fijn en is zalmrose van kleur met goudgeel aan de voet der bloemblaadjes. De struik groeit uitstekend.

Pink Perfume.

PAGEANT *(Jackson & Perkins 1953)*. Een zaailing van „Oranje Nassau", welke bijzonder grote bloemen geeft met 50—55 bloemblaadjes. Binnenkant der bloemblaadjes rood, buitenkant geel. Rijkbloeiend en geurend. Een der mooiste tweekleurige variëteiten.

Peace *(F. Meilland 1942)*. Ook bekend onder de volgende namen: Mme A. Meilland en Gloria Dei. De zeer grote, flink gevulde bloemen van deze roos zijn geel met een roserode schaduw. Zij is een forse groeier met mooi glimmend loof. Zeer aan te bevelen als snij- en perkroos. Zacht geurend.

PECHTOLD'S FLAME *(Jac. Verschuren-Pechtold, 1952)*. Door haar wel zeer aparte kleur valt deze roos uit duizenden op met haar goud sprankelend vlammend rood. Lange stevige takken dragen de zeer lange, elegante knoppen, die ook bij het openen hun kleur behouden, waaraan deze roos haar zo eigen charme ontleent.

Printemps *(F. Meilland 1948)*. De prachtige bloemen vallen direct op door de mooie kleurencombinatie: buitenkant der bloembladen zonnegeel, binnenkant zacht rose naar zalm.

PINK SPIRAL *(Mc Gredy 1953)*. De goed gevulde, alleenstaande bloemen hebben een donkerrose kleur. Goed gevormde knoppen, rijkbloeiend, gezonde, sterke groei. Geurend. Zeer goede snijroos.

President Herbert Hoover *(L. B. Coddington, New Jersey 1930)*. Forse, sterk rechtop groeiende plant, die gedurende de gehele zomer nieuwe scheuten met onberispelijke bloemen vormt. De knoppen zijn koperkleurig, wat met het verbloeien tot zalmrose overgaat. Afgesneden bloemen houden het op water lang uit. Rijkbloeiende, uitmuntende roos, welke zeer veel gevraagd wordt.

PRETORIA *(Moro 1953)*. De gematigd groeiende struiken produceren op stevige, rechte scheuten, lange, puntige knoppen, welke koperkleurig tot oranje zijn en met het verbloeien karmijnrode nuanceringen te zien geven. Glanzend, lichtgroen blad.

Profusion *(F. Meilland 1944)*. Kleur der goed gevulde bloemen is in knop aanvankelijk rood, later overgaand in zalmrose. De puntige knoppen zijn zeer lang en sierlijk gevormd. Goede perkroos. Zachtgeurend.

QUEEN ELISABETH *(Germain's Seed & Plant Co. 1954)*. Een prachtig helder rose roos, welke door haar felle sprankelende kleur sterk domineert. De behoorlijk gevulde bloemen zijn lang houdbaar en staan alleen of met meerdere op stevige takken. De struiken groeien zeer sterk en rechtop en zijn getooid met groot, donkergroen blad, hetwelk kerngezond is. Bloeien zeer rijk, komen bij elke weersgesteldheid goed open. In de rose variëteiten een sensationele aanwinst. All American Rose Selections 1955.

REGINALD FERNYHOUGH *(Bees 1954)*. De grote, sterk gevulde, fraai gevormde knoppen zijn prachtig zuiver rose van kleur en verspreiden bij het openen een heerlijke sterke geur. De

Gay Lady 1957.

planten groeien zeer sterk en hebben fris, bronsgroen blad. Dit is een der beste rose rozen, bloeit zeer overvloedig.

Souvenir de Jaques Verschuren *(Jac. Verschuren-Pechtold 1950).* De goed groeiende, rijk bloeiende, gezonde struiken prijken met edel gevormde, orane-bruin getinte, geurende bloemen, welke

goed gevuld zijn en bij elke weersgesteldheid hun kleurenrijkdom behouden. Deze voortreffelijke roos werd bij eerste keuring door de Kon. Mij. v. Tuinb. & Plantk. te Aalsmeer bekroond met getuigschrift 1e klasse. Op de tentoonstelling van Nos Jungunt Rosae te Apeldoorn, gehouden in 1949, verwierf zij de gouden medaille.

Serenade *(Jackson & Perkins 1947)*. Een zeer goede snij- en perkroos, rijk bloeiend met prachtige, oranje-zalmkleurige bloemen.

SKYLON *(W. Lowe & Sons 1953)*. De lange, puntige knoppen zijn vermiljoenrood, de geopende half gevulde grote bloemen meer abrikooskleurig. Fijn geurend. Zeer sterke, gezonde struiken, helder groen, glimmend blad.

Spek's Yellow *(H. A. Verschuren 1947)*. De kleur der onberispelijke bloemen, welke door flinke, lange bloemstelen gedragen worden, is kanariegeel. Zij houdt lang kleur en is zeer aan te bevelen zowel voor kas, als voor buiten. De beste in dit genre.

SATMIR *(Pedro Dot 1956)*. Gedragen door stevige scheuten, ontplooien de lange, edel gevormde knoppen, welke fluwelig karmijnrood zijn, zich tot behoorlijk gevulde, karmijnrode, zwak geurende bloemen. Een gezonde, sterke groei stempelt deze variëteit tot een goede aanwinst. Het rood, dat de jonge scheuten en bladeren siert is op zichzelf reeds mooi. Later is dit dofgroen.

Sutter's Gold *(Armstrong Nurseries 1950)*. Een prachtroos! Bloemen goudkleurig, knoppen granaatrood gestreept. De geurende bloemen zijn goed gevuld en zeer lang houdbaar. Een voortreffelijke snijroos en goede groeier. Gouden Medaille Bagatelle en Gouden Medaille Genève.

THE QUEEN *(Wm. Lowe & Son 1953)*. Deze roos werd in de handel gebracht ter gelegenheid van de kroning van Koningin Elisabeth van Engeland. De krachtig groeiende struiken, dicht bezet met glimmend, bronsgroen blad, brengen overvloedig fraai gevormde, oranjekleurige met zalmrose genuanceerde bloemen voort. Lange, puntige knoppen. Zacht geurend.

TIFFANY *(Howard of Hemet 1954)*. De lange, puntige knoppen zijn donkerrose en openen zich tot zeer goed gevulde bloemen, welke een sterke geur verspreiden. De kleur is dan donkerrose met goudgele nuance. De struiken groeien goed en rechtop, hebben gezond lichtgroen blad. Gouden medaille Portland; All American Rose Selections 1955.

Tanger *(Pedro Dot 1951)*. Deze kruising van Condesa di Sastago × Peace heeft alle goede eigenschappen van beide ouders in zich verenigd. De zeer grote, sterk gevulde, geurende bloemen zijn aan de binnenkant der bloemblaadjes helderrose tot rood, aan de voet geel, terwijl de buitenkant geel-wit is. Opvallende kleurencombinatie. Jonge bladeren lichtgroen, glimmend, later donkerder. Compacte groeier.

Taurinia *(Aicacardi 1950)*. Deze zacht rose, oranje genuanceerde, geurende variëteit verdient, mede om haar sterke groei en zeer fraai glimmend blad, zeker ook haar plaats in een mooi rozensortiment.

Texas Centennial *(Dixie Texas 1937)*. Een variëteit met alle goede eigenschappen van „Pres. Herbert Hoover", waarvan het een sport is. Kleur der onberispelijk gevormde knoppen is fluwelig ceriserood, terwijl de geopende bloemen abrikooskleurig genuanceerd zijn.

TAMARISK *(Ratcliffe 1954)*. De matig groeiende struik geeft grote, zeer goed gevulde, zuiver rose, geurende bloemen, waarvan de vorm gelijkt op die van een Camelia.

TONGA *(W. Lowe & Son 1955)*. De lange, puntige knoppen ontwikkelen zich tot sterk gevulde, middelmatig grote bloemen, welke fraai goudgeel tot oranje gekleurd zijn, terwijl de buitenkant der bloemblaadjes bronskleurig tot scharlakenrood genuanceerd

Golden Revelry.

zijn. Ze bezitten een heerlijke theerozengeur. De struiken zijn gezond en groeien middelmatig.

Virgo *(Ch. Mallerin 1947)*. Een mooi gekozen naam voor deze zuiver witte roos. Knoppen zeer elegant gevormd, welke ook bij ongunstige weersgesteldheid goed openkomen.

ROSA POLYANTHA HYBRIDA (ROSA FLORIBUNDA).

De z.g.n. baby-roosjes zijn bijzonder geschikt voor randbeplanting Ze bloeien rijk en aanhoudend bij 10-tallen tegelijk op een tak, zodat gehele trossen worden gevormd. Uit kruisingen met Theehybriden en Polyantha's zijn de grootbloemige Polyantha's ontstaan, welke min of meer het blad van de Theehybriden bezitten, doch door hun rijke en aanhoudende bloei verraden afkomstig te zijn van de ouderwetse baby-roosjes. **Kirsten- en Else Poulsen, Donald Prior, Salmon Spray** e.d., behoren tot deze groep, welke men in Amerika floribundarozen noemt (floribunda = veelbloemig).

Alain *(F. Meilland 1946)*. Kleur der goed gevulde bloemen is donkergeraniumrood; bloeit in grote trossen. De groei doet denken aan de bekende Salmon Spray. Vormt forse, losse struiken. Zeer gezonde, mooie aanwinst.

August Seebauer *(W. Kordes' Söhne 1944)*. Sterk groeiende struiken met zeer veel licht bronsgroen blad, waar boven de mooie donkerrose, goed gevulde bloemen zeer tot hun recht komen.

Betty Prior *(Prior & Sons 1934)*. Een waardevolle aanwinst in deze rozenklasse. De zeer sterk groeiende struiken bloeien tot diep in de herfst door met enkele, donkerrose bloemen. Vooral oudere planten bloeien zó rijk en houden zó goed hun kleur, dat ze in schoonheid de Else Poulsen verre overtreft. Ze heeft ook veel minder last van meeldauw.

Donald Prior *(D. Prior & Sons 1934)*. Deze wel zeer opvallende floribunda is de gehele zomer overdekt met fluweelrode bloemen, welke tamelijk groot en een weinig gevuld zijn, doch zo, dat de gouden meeldraden duidelijk zichtbaar blijven. De planten vormen steeds nieuwe scheuten met kerngezond blad. Groeiwijze losser dan van Karen Poulsen, zodat de bloemen meer door de plant verdeeld zitten.

Else Poulsen *(Poulsen 1924)*. Een bijzonder mooie halfgevuldbloemige polyantharoos. Haar kleur is levendig rose met iets

Vele Polyantha's bloeien van begin Juni tot begin November.

London Pride 1957.

donkerder knoppen. Een zeer goede groei en bloei kenmerken haar als een der beste variëteiten.

Fashion *(Jackson & Perkins 1948)*. Kruising van Pinocchio × Crimson Glory. De afzonderlijke bloemen van deze Amerikaanse aanwinst hebben de vorm van een theehybride en zijn zalmkleurig met perzikrode nuancering. Geheel nieuwe kleur in de floribundarozen. Vormt gevuldbloemige, grote trossen en heeft brons-bruine bladeren. Groeit breed uit. Werd o.a. bekroond met Gouden Medaille N.R.S. 1948; Gouden Medaille Bagatelle 1949, Get. v. Verd. te Genève.

Floradora *(M. Tantau 1950)*. De zacht geurende, goed gevulde bloemen zijn oranjerood van kleur. Lange puntige knoppen. Leerachtig, glanzend blad. Goede groeier.

Frensham *(Norman 1946)*. Deze sterk groeiende, gezonde variëteit brengt grote, warmrode, zeer opvallende bloemen voort van een uitzonderlijke schoonheid. Takken sterk bedoornd.

Fru Inge Poulsen *(D. T. Poulsen 1949)*. Deze variëteit met haar kleine, zacht rose, goed gevulde bloemen bloeit rijk met grote trossen en is tevens een gezonde, flinke groeier, welke evenwel niet hoog wordt. Get. v. Verd. N.R.S.

Gaudia *(M. Leenders & Co. 1946)*. Deze schitterende egelantier-roserode op goud en zalmkleurige grond, grote half gevulde en welriekende roos is een kruisingsproduct tussen Florentina en Talisman. Zij is een mooie perk- en snijroos van een zeldzame brillante kleur.

Holländerin *(1951)*. Prachtig helderrood met oranje gloed gekleurde bloemen. De struiken groeien krachtig, waardoor een rijke bloei is verzekerd. Een der mooiste aanwinsten in dit genre.

Independence *(W. Kordes' Söhne 1950)*. Een kruisingsproduct van Crimson Glory × Baby Château, dat allerwegen bewondering wekt! De uitzonderlijke oud-baksteenrode kleur met menierode nuancering handhaaft zich ook bij het verbloeien der zeer lang houdbare bloemen, welke goed gevuld en edel van vorm zijn. De bloemen verschijnen in trossen, waarvan elke bloem afzonderlijk meer op een theehybride dan op een floribunda gelijkt. Bovendien een sterke groeier en zeer winterhard. Het jonge loof is rood getint. Bekroond o.a. met de Gouden Medaille van Bagatelle; in Engeland met de Gouden Medaille van de N.R.S.; in ons land de Ereprijs v. d. Spec. Rozenkeuring te Aalsmeer, Oct. 1951.

JIMINY CRICKET *(Jackson & Perkins 1954)*. Dit is de meest sensationele nieuwe floribundaroos der laatste jaren. Haar half gevulde bloemen verschijnen in grote, mooi gevormde trossen en zijn in knop prachtig vermiljoenrood met oranje, terwijl de meer geopende bloemen een weinig naar koraalrose overgaan. Bovendien groeien de struiken flink, zijn getooid met donkergroen glimmend blad en bloeien de gehele zomer tot diep in de herfst. All American Rose Selection 1955.

Kirsten Poulsen *(Poulsen 1924)*. Helderrode, enkele bloemen. Zeer decoratief. Buitengewoon geschikt voor grote vakken en groepen.

Karl Weinhausen *(M. Tantau 1942)*. Grote trossen fluweelrode, half gevulde bloemen. Zeer sterke, doch niet te hoge groei. Veel en groot groen-roodachtig blad.

LULLABY *(Bosley Nurseries 1955.)* Deze echte polyantha bloeit het gehele seizoen met grote trossen zuiver witte, goed gevulde bloemen. Groei zeer goed, doch blijft laag.

Masquerade *(Jackson & Perkins 1949)*. Meest sensationele aanwinst der laatste jaren, omdat deze variëteit bloeit met meerdere

kleuren op één plant, n.l. variërend van goudgeel tot donkerrood. Bovendien mooi glimmend, frisgroen loof. Een bijzonder aardige perkroos.

MA PERKINS *(Jackson & Perkins 1952).* Grote halfgevulde bloem, in knop zalmrose, geopend zacht rose, heeft de vorm van een theehybride. Sterk geurend. De goede, gelijkmatige groei verzekert een rijke bloei. Prachtig bronsgroen blad, zeer gezond All American Rose Selections 1953.

MAGRANA *(Pedro Dot 1954).* Een roos welke met haar wel zeer aparte granaatrode kleur sterk de aandacht op zich vestigt. De bloemen zijn gevuld, middelmatig groot en lang houdbaar. Struiken groeien en bloeien goed. Een geheel nieuwe kleur in de rozen.

NYMPH *(Alex Dickson & Sons 1953).* Een polyantha, die in groeiwijze met Fashion overeenkomt, waarvan het dan ook een zaailing is. Haar goed gevulde bloemen zijn koraalrood met zalmkleurige nuances en fijn geurend. De goed groeiende struiken blijven compact en hebben donkergroen, leerachtig blad.

Orange Triumph *(W. Kordes' Söhne 1937).* Een zeer mooie variëteit. De planten groeien fors, zonder hoog te worden. Ze munten uit door zeldzaam rijke bloei en bijzonder grote trossen. De kleur der bloemen is diep oranje tot steenrood, terwijl de dichte knoppen, alsmede het jonge blad bronsbruin getint zijn. Deze kleurencombinatie is geheel nieuw en effectvol.

Lydia.

OBERON *(Alex. Dickson & Sons 1955)*. Bloemen zijn half gevuld, verschijnen in grote trossen en zijn zalmrose met een abrikooskleurige nuancering. Deze zeer mooie, echte polyantharoos is laagblijvend en bekleed met lichtgroen, glimmend blad.

ORANGE SWEETHEART *(E. S. Boerner 1952)*. Een der mooiste oranje getinte polyantha's. Flinke trossen met gevulde bloemen. Compact groeiende struiken met veel donker bronsgroen blad. Een zeer verdienstelijke aanwinst.

POLLY PRIM *(H. M. Eddie & Sons 1953)*. Deze kruising van Goldilocks × Geh. Duisberg tooit zich met Primulagele knoppen. De geopende bloemen zijn zuiver geel en verkleuren niet. De in grote trossen verschijnende bloemen hebben de vorm van een theehybride. De struiken hebben fraaie bronsgroen, glimmend blad, groeien uitstekend, doch blijven compact.

PIGMY RED *(Jackson & Perkins 1954)*. Matig gevulde, helderrode bloemen, zeer overvloedig in trossen verschijnend. Door haar zeer compacte groeiwijze vooral ook voor kleine tuinen geschikt. Goede vochthoudende grond en niet te hete standplaats zijn eisen waaraan moet worden voldaan.

Paul Grampel *(G. H. Kersbergen 1930)*. Bloemen iets minder gevuld dan van Gloria Mundi, kleur helder oranje-rood. Planten groeien goed.

Pinocchio *(W. Kordes' Söhne 1948)*. De grote trossen met langzaam openkomende, goed gevulde en lang houdbare bloemen zijn zalmrose met oranje nuancering, zodat men zich aan haar bekoring niet kan onttrekken. Getuigschrift 1e klasse K.N.M. v. T. & Pl. '50.

Red Pinocchio *(Jackson & Perkins 1947)*. De compact groeiende, gezonde struiken tooien zich met heldergroen blad, waar de donker-fluweelrood gekleurde bloemen, die goed gevuld en lang houdbaar zijn, fel tegen uitkomen.

SANDRINGHAM *(Henry Morse & Sons 1955)*. Sterk groeiende struiken, met lichtgroen glimmend blad, vormen onophoudelijk scheuten met grote trossen, geurende, half gevulde, zwavelgele bloemen. Een zeer waardevolle, gele floribundaroos.

VENUS *(G. Maarse Jbzn. 1955)*. Deze polyantha is een zaailing van Pinocchio. Haar zuivere witte, zeer goed gevulde bloemen verschijnen in grote trossen op matig lange, stevige takken. Een opmerkelijke verbetering van de bestaande witte variëteiten.

Voque *(Jackson & Perkins 1951)*. Zaailing van Fashion. Een rijke bloeier en forse groeier, opvallend warm zalmrood van tint.

ROSA CHINENSIS MINIMA (MINIATUURROOSJES).

De meeste variëteiten worden niet hoger dan 15—20 cm en zijn daarom uitermate geschikt voor kleine tuinen, rotstuinen en potcultuur. Ze bloeien de gehele zomer onafgebroken door. Bloempjes niet groter dan 2—3 cm. Plantafstand 20—25 cm.



Margaret.

Baby Goldstar *(Pedro Dot 1940)*. Primulageel.
Cinderella *(J. de Vink 1952)*. Vleeskleurig naar wit. Geurend.
Granate *(Pedro Dot 1948)*. Granaatrood.
Midget *(J. de Vink 1940)*. Licht rose.
Perla de Alcanada *(Pedro Dot 1945)*. Karmijnrood.
Pour Toi *(Pedro Dot 1945)*. Wit-geel.
Red Imp. Donker karmijnrood.
Red Elf *(J. de Vink 1951)*. Donkerrood.
Rosa rouletii (Afkomstig uit China). Levendig rose.
Rosina *(Pedro Dot 1942)*. Zonnebloemgeel.

Sweet Fairy *(J. de Vink 1946)*. Knop donkerrose overgaand in appelbloemrose.

Climbing Perla Rosa *(Pedro Dot 1949)*. Zuiver rose.

Climbing Perla de Alcanada *(Meilland 1952)*. Karmijnrood.

ROSA INDICA NOISETTEANA (NOISETTE ROZEN).

Van deze rozen is de groei sterker dan van theerozen; bloeien rijk, vooral in 't najaar. Lang snoeien.

Bouquet d'Or *(Ducher 1873)*. Goede klimroos. Grote gele tot zalmkleurige bloem.

Mme Alfred Carrière, *(Schwarz 1880)*. Noiset hybride, grote, licht vleeskleurige, witte klimroos. Zacht geurend.

Rêve d'Or *(Ducher 1880)*. Donkergele, gevulde bloem. Beste klimroos.

ROSA HYBRIDA BIFERA (HYBRIDE REMONTANT-ROZEN).

Uit deze groep zijn slechts enkele goede overgebleven. Ze zijn voor 't merendeel verdrongen door de Thee-hybr. Zeer zeker kwamen er in deze groep zeer mooie variëteiten voor, welke soms heerlijk geurden, maar hun vatbaarheid voor velerlei ziekten deed ze uit de cultuur verdwijnen. Gelukkig bestaan er heden in de Theehybriden vele goed geurende rozen.

Frau Karl Druschki *(P. Lambert 1901)*. Groeit buitengewoon sterk en wanneer men deze variëteit lang snoeit, bloeit ze mild. Is vooral als stamroos zeer mooi, ze maakt grote kronen, overdekt met zuiver witte rozen, welke groot, doch mooi van vorm zijn.

Druschki rubra *(Peter Lambert 1929)*. Komt in groei geheel met de gewone Frau Karl Druschki overeen. De kleur der bloem is rood. Goede roos voor groepsbeplanting.

KLIMROZEN.

Klim- of leirozen worden tegenwoordig zeer veel gebruikt. Er zijn nog maar weinig tuinen, waar men ze niet aantreft tegen het huis, langs het hek, of als pergola's in de tuin; of, zoals in grote parken als 't ware als „spinnen" in 't gazon. Men plant klimrozen vooral ook daar, waar ze zich vrij kunnen ontwikkelen; hier en daar een kleine verhoging onder een tak zal het geheel een decoratief aanzien geven.

Alleen het uitgebloeide overtollige hout mag men er uit nemen; in **geen geval** de krachtige jonge scheuten, welke 't volgende jaar de mooiste bloemen geven. 't Is niet goed het eerste jaar na planten

Geef Uw nieuw geplante rozen vooral in het voorjaar zeer veel water.

Pageant.

bloemen te verwachten; wil men dit toch, dan snijdt men het dunne hout er uit en legt de dikkere takken op de grond om ze met een laagje aarde te bedekken tot de ontwikkeling een aanvang neemt.

Ook in de eerder genoemde rozensoorten waren klimrozen, zodat deze niet meer herhaald worden, daar ze ter plaatse als zodanig zijn aanbevolen.

ROSA MULTIFLORA HYBRIDEN.

American Pillar *(Conard & Co. 1909)*. Grote trossen met helderrose bloemen, gele meeldraden, welke mooi uitkomen. Sterke groeier, beste roos.

Turner's Crimson Rambler *(Turner 1894)*. Grote trossen mooie rode bloemen, gevuld. Moet vrij staan, ander veel last van „'t wit".

Veilchenblau *(J. C. Schmidt 1909)*. Eigenaardig lila-blauwe kleur.

Waltham Bride. Zuiver witte bloemen.

ROSA WICHURAIANA.

„Memorial" *(Dr. Wichura 1887)*. Deze soort bloeit met zuivere witte, enkele bloemen, waarin de goudgele meeldraden zeer mooi uitkomen. Klein glanzend blad. In de winter is de plant met oranjerode vruchten bezet, wat haar decoratieve waarde ten zeerste verhoogt. Ze leent zich in 't bijzonder tot het bekleden van laag hekwerk en hellingen.

ROSA WICHURAIANA HYBRIDEN.

Albéric Barbier *(Barbier 1900)*. Gele knop, bloem wit met geel hart.

Anna Rübsamen *(Weigrand 1904)*. Zeer mooie rose verscheidenheid. Glimmende fijne bladeren.

Breeze Hill *(v. Fleet 1927)*. Groei komt overeen met de Gloire de Dijon. Bloeit met grote trossen. Haar kleur is crême met zalmkleurig rose.

Dorothy Perkins *(Perkins 1903)*. Dit is wel een der mooiste klimrozen in de rose variëteiten. Ze tooit zich met grote trossen gevulde warm rose bloemen. Groeit sterk.

Excelsa *(Walsh 1910)*. Zeer mooie gevulde zuiver rode bloem, in grote trossen bloeiend. Blad mooi glimmend. Een der beste in dit genre.

Fräulein Octavia Hesse *(Hesse 1910)*. De bloemen zijn geelachtig wit van kleur en gevuld. Het blad is glanzend.

Hiawatha *(Walsh 1905)*. Zeer mooie, enkelbloemige, helderrode roos met wit hart en gele meeldraden. Sterk groeiende klimroos, welke ten volle kan worden aanbevolen.

La Perle *(Faque et Fils 1904)*. Goed groeiende met helder glimmend blad getooide plant, waarop de roomwitte bloemen zeer goed uitkomen.

Léontine Gervais *(Barbier 1904)*. Zalmkleurige bloem; eveneens glimmend blad. Goed groeiende plant.

Orange Triumph. Een rankende sport van de bekende Polyantharoos van dezelfde naam. Bloeit met grote trossen, kleur steenrood.

Paul Noël. Oranje-koperkleurige bloemen. Rijk bloeiend.

René André *(Barbier 1900)*. Goudgele tot oranjerode bloemen.

Snowflake *(F. Cant & Co. 1922)*. Grote witte bloemen verschijnende aan flinke trossen. Groeit sterk.

Spuit Uw klimrozen op tijd met een der op blz. 8 genoemde middelen tegen „'t wit".

Henri Mallerin.

GROOTBLOEMIGE WICHURAIANA HYBRIDEN.

Albertine *(Barbier 1922)*. Een koperrose klimroos, met zalmkleurige nuances. Grote, dubbele bloemen. Plant groeit sterk. Toppen der scheuten opvallend rood van kleur, terwijl het oudere gedeelte, zowel bladeren als hout, glimmend rood-bruin getint is. Geurend.

Blaze *(Jackson & Perkins 1933)*. Bloemen als van Paul's Scarlet Climber, doch doorbloeiend.

CORAL DAWN *(Jackson & Perkins 1953)*. Weer een fraaie, zuiver rose klimroos, geschikt voor het beplanten van hekken en niet te hoge muren. De in trossen verschijnende grote, goed gevulde bloemen bloeien gedurende de gehele zomer zeer rijkelijk en zullen niet nalaten ieders bewondering af te dwingen. Geurend.

Dr. W. van Fleet *(v. Fleet 1910)*. Een zeer mooie, aanbevelenswaardige klimroos, welke zich met zacht rose, gevulde bloemen tooit. Goede groeier. Zacht geurend.

Emily Gray *(Williams 1918)*. Half gevulde goudgele bloemen. Zeer sterke groeier. Mooi glimmend blad.

New Dawn *(Sommerset Rosenursery 1930)*. Een variëteit, welke in ieder opzicht op Dr. W. van Fleet gelijkt. Bloeit echter de gehele zomer door. Geurend.

PINK CLOUD *(Jackson & Perkins 1952)*. De mooie bekervormige, rose-rode, zeer grote bloemen, met theerozengeur, verschijnen de gehele zomer. Geschikt voor hekken.

Paul's Scarlet Climber *(W. Paul & Son 1916)*. Een der beste rode klimrozen. Soms ziet men geen blad en is alles één vuurrode gloed. De bloemen zijn tamelijk gevuld en groot.

Rochester *(Jackson & Perkins)*. Half gevulde, roomgele bloemen. Planten groeien sterk en bloeien rijk.

KLIMMENDE HYBRIDE THEEROZEN.

Allen Chandler *(George Prince 1925)*. Deze fluweelrode klimroos doet denken aan de bekende K of K; zowel de kleur als de vorm der bloemen. Bloeit in de eerste helft van Juni, terwijl ze in de herfst weer een massa bloemen voortbrengt op de toppen der jonge scheuten.

Climbing Mme Caroline Testout *(Chauvry 1903)*. Evenals Mme C. Testout, rose.

Climbing Mme Edouard Herriot *(Ketten frères 1921)*. Zie gewone Mme Ed. Herriot. Koraalrood.

CLIMBING ENA HARKNESS *(R. Murrel 1954)*. Donkerrood. Bloeit rijk. Geurend. Zie gewone Ena Harkness.

Climbing Etoile de Hollande *(Leenders 1931)*. Zie gewone Etoile de Hollande. Rood.

Polly Prim.

Climbing Katherina Pechtold *(Jac. Verschuren—Pechtold)*. Zie gewone Kath. Pechtold. Zalmkleurig. Vooral op zwaardere grond zeer mooi.

Climbing Texas Centennial. Zie gewone Texas Centennial. Abrikooskleurig.

CLIMBING FLAMING SUNSET *(Joh. Mattock 1954)*. Een matig groeiende klimroos, welke mooi gevormde, zalm-onranjekleurige bloemen geeft.

Climbing Ophelia *(Alex Dickson & Son 1920)*. Zie hybride Theerozen. Rose.

Climbing Paul Ledé *(Stuart Low 1913)*. Goudgeel, rose genuanceerd. Goedgevulde grote bloem. Zeer mooi.

Climbing Mrs. Äāron Ward *(A. Dickson 1922)*. Matig grote oranjeachtige roos. Bloeit rijk.

CLIMBING NEW YORKER *(Jackson & Perkins 1953*. Fluweel scharlakenrood. Zie gewone New Yorker. Bloeit rijk, is sterk en gezond. Goed winterhard.

DESCANSO *(Germain's Seed & Plant Co. 1954)*. De scharlaken-

rode, grote, goed gevulde bloemen, welke zalmkleurig genuanceerd zijn, komen op het mooie glanzende blad zeer goed uit. Een sterk en gezond groeiende variëteit.

Doubloons *(Horvarth 1935)*. Zuiver gele bloemen. Rijkbloeiend.

Golden Climber *(W. Brownel 1933)*. De goed groeiende plant brengt dan overvloedig goudgele bloemen voort, als men de takken horizontaal aanbindt. Geurend.

Guinée *(Mallerin 1936)*. Een zeer mooie aanwinst onder de klimrozen. De bloemen zijn mooi gevormd, hebben een tintelende donkerrode kleur en geuren fijn. Doorbloeiend.

Le Rêve *(Pernet 1925)*. Half gevulde zonnebloemkleurige bloemen.

Love *(Mallerin 1935)*. Doorbloeiende, scharlakenrode roos.

Mme Grégoire Staechelin *(Pedro Dot 1927)*. Sterk groeiende plant, welke reeds vroeg in de zomer overladen is met zacht rose, gevulde bloemen. De knoppen hebben een lange, puntige vorm.

PARADE *(Jackson & Perkins 1953)*. De grote bloemen met 30—35 bloemblaadjes zijn rose-rood van kleur, lang houdbaar en geurend. De forse takken hebben bronskleurig blad en brengen aanhoudend bloemen voort.

RED FLARE *(Jackson & Perkins 1954)*. Donkerrode, zeer goed gevulde bloemen, welke bijna niet verkleuren. Zwak geurend. Groei matig.

Teide *(Pedro Dot 1948)*. Een kruisingsproduct van Texas Centennial × Guinee. Deze doorbloeiende klimroos is uitermate geschikt voor het bekleden van hekken en lage muurtjes. De scharlaken-karmijnrode, volmaakt gevormde bloemen staan op sterke stelen. De rode takken hebben glimmend groen-rood blad.

BOURBONROOS.

Zéphirine Drouhin *(Bizéot 1868)*. Algemeen bekende en gewaardeerde klimroos, welke in de voorzomer overdekt is met donkerrose, half gevulde bloemen. Bloeit daarna de hele zomer geregeld door tot diep in 't najaar. De jonge bladeren zijn bruinrood gekleurd, wat een mooi effect geeft. De plant heeft geen stekels.

DIVERSE KLIMROZEN UIT DE GROEP THEE- EN HYBRIDE THEEROZEN, ENZ.

Deze rozen zijn in de betreffende groepen reeds beschreven, zodat alleen de namen volgen.

BONN *(zie Botanische rozen)*.
Bouquet d'Or *(zie Noisette rozen)*.
Elmshorn *(zie Botanische rozen)*.
Gloire de Dijon *(zie Theerozen)*.
Golden Wings *(zie Botanische rozen)*.
Johanna Sebus *(zie hybride Theerozen)*.
Mme Isaäc Pereire *(zie hybr. Remontantrozen)*.
Maréchal Niel *(zie Theerozen)*.

Coral Dawn (klimroos)

Mme J. Gravereaux *(zie Theerozen).*
Meg *(zie Botanische rozen).*
Rêve d'Or *(zie Noisette rozen).*
Till Uhlenspiegel *(zie Botanische rozen).*

TREURROZEN.

Deze zijn verkrijgbaar in de volgende variëteiten: *Dorothy Perkins, Excelsa, White Dorothy.*

BOTANISCHE- EN PARKROZEN.

Onder deze rozen verstaat men wilde soorten, waaronder zeer mooie voorkomen. Ze zijn in 't bijzonder schikt voor groepsbeplanting en worden in 't algemeen nog veel te weinig gebruikt. **Botanische rozen mogen niet worden gesnoeid.** In de winter, nadat de bottels zijn afgevallen, worden de oude takken voor zover dit nodig is, weggenomen. De jonge twijgen blijven zitten en mogen niet worden ingekort. Hieraan komen in Mei—Juni de bloemen.

Queen Elisabeth.

Jiminy Cricket.

Rosa Alpina. Syn.: R. pendulina. Bleekrose enkelbloemig. Sterke groeier, weinig of geen doornen.

Rosa Arvensis. Witte bloemen. Blauwachtig bruine scheuten. Klimroos.

Rosa Alberti. Grote, zacht rose, enkele bloemen. Mooie heester.

Rosa Californica. Bloeit geregeld met karmijnrose bloemen.

Rosa dahurica. Karmijnrode bloemen. Bossige, dicht bebladerde struik.

Rosa ecae. Enkele botergele bloemen. Vroeg bloeiend. Mooie stekels en fijn blad.

Rosa Fargesii. Gelijkt op Rosa Moyesii, groei is echter meer horizontaal. Bloemen fluweelachtig karmozijn getint. Lange, scharlakenrode bottels.

Rosa filipes. Sterk groeiende struik, zwaar bedoornd. Trossen enkele crême bloemen.

Rosa hugonis. Bloeit vroeg met enkele gele bloemen. Bijzonder mooie stekels en fijn blad.

Rosa hugonis Dr. Mill. Krachtig groeiende struiken met mooi fijn blad. Enkele geelachtige bloemen.

Rosa Lambertiana Hamburg. Vormt op de einden der scheuten grote trossen halfgevulde, fluweelrode bloemen. Bloeit de gehele zomer.

Rosa Lambertiana Bonn *(W. Kordes' Söhne 1950)*. Een doorbloeiende klimroos, welke echter ook als parkroos gebruikt kan worden. De ouders, Rosa Lambertiana Hamburg en Independence verleenden deze roos haar vermiljoen- tot menierode kleur. Ze bloeit met omvangrijke trossen, grote halfgevulde bloemen en is winterhard. Gouden Medaille N.R.S.

Rosa Lambertiana Sangerhausen. Zeer mooie, enkelvoudige, bloedrode bloemen. Goede groeier, wordt niet hoog; bloeit de gehele zomer.

Rosa Lambertiana Schwerin. Flinke trossen, kleinbloemige, goed gevulde, helderrode roosjes. Doorbloeiend.

Rosa Lambertiana Elmshorn *(W. Kordes' Söhne 1951)*. Geschikt om in groepen te planten, maar ook als klimroos voor lage hekken. Bloeit met grote trossen de gehele zomer door, kleur lichtrood.

Rosa Lambertiana Wilhelm. Half gevulde, stralende rode bloemen. Verschijnen de gehele zomer in grote trossen.

Rosa Lambertiana WILL SCARLET *(Hilling 1953)*. Bloeit in grote trossen tot laat in de hefst. Kleur schitterend scharlakenrood. Sport van Wilhelm. Ook geschikt voor bekleding van hekken en lage muurtjes. Trial Ground Certificate N.R.S.

Rosa Lambertiana GOLDEN WINGS *(Bosley Nurseries 1955)*. Enkelvoudige kanariegele bloemen, alleenstaand en in trossen. Kan ook als klimroos voor lagere hekken dienen. Doorbloeiend.

Rosa Lambertiana MEG *(Harkness & Co. 1955)*. Bloeit de gehele zomer met half gevulde bloemen, welke koraal- tot zalmkleurig zijn. Voor het bekleden van lager hekwerk zeer geschikt.

Burnsby 1957.

Rosa hybrida Nevada. Licht rose, in wit overgaande grote, enkelvoudige bloemen.

Rosa lucida *(syn. Rosa virginiana)*. Grote, fraai rose bloem. Glanzend blad. Wordt in 't najaar donkerbruin.

Rosa foetida. Helder gele, matig gevulde bloem. Prachtheester.

Rosa foetida bicolor. Enkele bloemen, geel aan de achterzijde, bruin aan de binnenkant. Wordt veel te weinig gebruikt.

Rosa foetida Harrissoni. Half gevulde, heldergele bloem. Eveneens een mooie struik.

Rosa foetida „Persian Yellow". Iets meer gevulde bloem dan voorgaande en donkerder geel.

Rosa microphylla. Een sierheerstertje met zeer kleine mooie blaadjes, welke in Juni lichtrose, enkele bloemen geeft. Grote, zeer sterk behaarde bottels.

Rosa multiflora japonica. Sterk groeiende plant, ook als klimroos te gebruiken. Is overdekt met duizenden kleine witte bloempjes, waarvan de meeldraden goed zichtbaar zijn.

Rosa multibracteata. Grote lichtrode bloemen. Bloeit de gehele zomer. Fijnbladig.

Rosa Moschata. Enkelbloemige, witte verscheidenheid. Sterk groeiend, niet winterhard.

Rosa Moyesii. Een meer bekende in deze groep. Mooi blad en karmijnrode bloemen maken deze roos tot een ware sierplant; bovendien in 't najaar mooie rode vruchten.

Rosa Moyesii superba. Ontstaan uit een kruising van de roos Charles P. Kilham (theehybride) en Rosa Moyesii. Bloemen zijn groot en gevuld, kleur als van Rosa Moyesii.

Rosa nitida. Overdekt met kleine karmijnrose roosjes. Fijn geurend. Zeer mooi glimmend bruin-groen blad. Behoudt tot diep in de winter de kleine ronde bottels. Zeer geschikt voor het vormen van laagblijvende hagen.

Rosa oxyodon. Mooie heester met bruine takken en licht rose bloemen. Zeer goede groeier. Fijn geurend.

Rosa pimpinellifolia *(syn. Rosa spinosissima)*. Het duinroosje. Laag gedrongen heestertje, dat kleine, enkele, witte bloempjes geeft.

Rosa spinosissima Stanwell perpetual. Zeer goed gevulde, zacht rose bloemen met een fijne geur. De struiken worden niet hoog, ze bloeien de gehele zomer.

Rosa spinosissima hispida. Grote, enkele bloemen zijn zwavelgeel, worden met het verbloeien roomkleurig.

Rosa spin. hisp. Frühlingsgold. Grote, enkele, goudgele bloemen. Sterke groei. Gebogen takken.

Rosa pisocarpa. Een heester welke ± 2 m hoog wordt. Bloemen tamelijk groot, enkelbloemig en purperrose van kleur.

Rosa pomifera. Helderrose enkele bloemen. In het najaar overdekt met zeer mooie grote, lakrode bottels.

Rosa rubrifolia. Dit is een zeer mooie heester met violetrode bladeren en takken, waarover een blauwachtige gloed ligt. Enkele, rose bloemen.

Rosa sempervirens. Enkelvoudige witte bloemen. Vormt dun hout en donkergroen blad.

Rosa omeiensis var. sericea pteracantha. Een der mooiste soorten in deze groep. Ze heeft varenachtige bladeren en de takken zijn overdekt met reusachtig grote doornen, welke vooral in hun jeugdstadium doorschijnend rood zijn. De bloemen zijn enkel en wit. Zeer geschikte solitairplant.

Rosa viridiflora. Compact heestertje, dat groene bloemen geeft. Eigenaardige soort.

Klimroos Parade.

Rosa Watsoniana. Aardig heestertje, dat geschikt is voor rotspartijen. Bloemen zijn wit van kleur. Weinig gedoornde, liggende takken.

Rosca clinophylla. Wit-rose bloemen.

Rosa cinnamomeae. (Kaneelroos). Mooie purperkleurige bloemen, wordt circa 1.50 m hoog.

Rosa foliolosa. Rose bloemen.

Rosa Willmottiae. Enkelvoudige bloemen met een levendig rode kleur. Zeer fijne blaadjes. 't Mag een wonder heten, dat zo'n roos niet veel meer wordt aangeplant.

Rosa canina. De bekende hondsroos; wordt gebruikt voor hagen, alsook voor bosbeplanting.

Rosa rubiginosa. De algemeen bekende Sweetbriar. Geurt als zure appelen; geschikt voor hagen.

Réveil Dyonnais. Planten zijn getooid met helder glimmende bladeren en brengen regelmatig dieprose, in geel overgaande bloe-



Tamarisk 1957.

men voort, terwijl de buitenkant der bloemblaadjes geel is. Een aantrekkelijke roos.

Parkfeuer. Rood getinte bladeren en takken. Sterk groeiende plant, welke een schat van vuur rode bloemen schenkt.

Till Uhlenspiegel *(W. Kordes' Söhne 1950)*. De hooggroeiende planten bloeien slechts eenmaal met donkerrode bloemen in flinke trossen en zijn lang houdbaar. Sterk rood getinte scheuten en bladeren. Deze variëteit, welke ook zonder bloemen een sierraad in de tuin is, heeft bijna geen doornen. Ook als klimroos voor hekken te gebruiken.

ROSA RUGOSA (JAPANSE ROOS).

Zeer mooie sierheesters, welke na een overvloedige bloei in 't najaar overdekt zijn met oranjekleurige vruchten. Weinig snoeien, alleen oud hout, dat te veel is, er uithalen.

Rosa rugosa alba. Grote, enkele, witte bloem.
Rosa rugosa rubra. Grote, enkele, rode bloem.
Rosa rugosa Schneezwerg. Doorbloeiend wit; dubbele bloemen.
Rosa rugosa F. J. Grootendorst. Flinke trossen, kleine dubbele rode bloemen. Bloeit de gehele zomer.

ROSA RUBIGINOSA HYBRIDA (LORD PENZANCE'S SWEET BRIARS).

Mooie, enkelbloemige rozen, waarvan de bladeren een heerlijke, op zure appelen gelijkende geur verspreiden. Geschikt voor hagen en heestergroepen. In 't laatste geval alleen het oude hout uitsnijden, overigens niet snoeien. Sommige variëteiten zijn gedurende de winter overvloedig met oranjerode bottels bezet.

Anne of Geierstein, rose.
Amy Robsart, roserood.
Brenda, licht rose.
Edith Bellenden, licht rose.
Flor Mac Ivor, rose.
Green Mantle, rose.
Jenny Deans, rood.
Lady Penzance, geel.
Lucie Bertram, rood.
Magnifica, karmijnrood.
Meg Merrilees, karmozijn.
Rosa Bradwardine, rose.
Refulgence, rood.

GOLDBUSH *(W. Kordes' Söhne 1954)*. Bloeit met zuiver gele bloemen. Zeer sterke groeier. Winterhard.

ROSA CENTIFOLIA MUSCOSA (MOSROOS).

Rosa communis. Rose mosroos, geurende bloemen, mooie, bemoste knoppen.
Blanche Moreau. Gevulde, grote, witte bloem. Met mos bezette knoppen. Rijke bloeier.
Captain J. Ingram. Donkerrode bloemen.
Deuil de Paul Fontaine. Purperachtig gekleurde roos.
Salet. Rose, goed gevulde bloemen.

FRUITBOMEN

Het is van zeer groot belang, vruchtbomen reeds vroeg in de zomer te bestellen, daar men er dan van verzekerd kan zijn, dat de gewenste variëteiten en vormen, in deze catalogus vermeld, nog aanwezig zullen zijn.

Vruchtbomen kopen is een zaak van vertrouwen, het is daarom geen gewoon handelsartikel.

Onze jarenlange ervaring en reputatie bieden U de beste waarborgen.

Indien gewenst, geven wij gaarne ter plaatse advies.

Voor het aanleggen van fruittuinen, boomgaarden enz., alsmede het onderhouden daarvan, bevelen we ons ten zeerste aan.

Voor het welslagen van een fruittuin of boomgaard is vakkundige voorlichting gewenst.

Kosten daaraan verbonden worden op de meest billijke wijze berekend.

Een goed onderhouden fruittuin geeft U minstens evenveel genot als een siertuin. Het nuttige wordt alzo met het aangename verbonden. Vooral nu het handelsfruit in koelhuizen wordt bewaard en dit fruit de onaangename „koelhuissmaak" krijgt, is het voor een tuinbezitter meer dan ooit geboden vruchtbomen te planten, vooral de late variëteiten, welke men kan bewaren. Beter een minder mooie appel uit eigen tuin met een goede smaak, dan een gekochte mooie vrucht, welke tegenvalt. Ook in kleinere tuinen is altijd wel plaats voor vruchtbomen bijv. in snoer- en Uvorm en palmet candelabre langs een afscheiding of achterkant waar men anders wel een haag plant, welke niets oplevert, terwijl vruchtbomen U van hun bloesempracht en vervolgens van hun vruchten doen genieten.

Voor de aanleg van particuliere fruittuinen hebben wij steeds oudere bomen beschikbaar in alle aangeboden vormen, volop bezet met vruchthout en speciaal voor dit doel gekweekt. Ze kunnen zonder enig risico worden verplant en reeds het eerste jaar dragen. Op aanvraag maken wij gaarne offerte.

Er zijn in de loop der jaren vele fruitkwekerijen door ons aangelegd met oudere bomen. Het tijdstip der rentabiliteit wordt op deze wijze aanmerkelijk vervroegd; wij kunnen U deze bedrijven te allen tijde laten zien.

Het planten van fruitbomen moet met de meest mogelijke zorg geschieden.

Veelal wordt dit aan een onoordeelkundige overgelaten, die ze nu eens te diep, dan weer te hoog plant. 't Eerste euvel is erger dan het tweede, vooral op te vochtige gronden; in een dergelijk geval kunnen de wortels niet goed functioneren en zijn een goede groei en vruchtbaarheid niet te verwachten. Men plant de bomen niet dieper dan ze in de kwekerij stonden, wat te zien is aan de donkere rand onder aan de stam. De veredelingsplaats moet boven de grond blijven, anders maken de bomen eigen wortels, waardoor

de vruchtbaarmakende eigenschap van de onderstam verloren gaat.

Men laat dus de bomen planten door ter plaatse goed bekend staande vaklieden. Lang **niet alle gronden** zijn geschikt voor fruitteelt, veengrond bijv. is meestal te waterrijk en vaak te zuur voor appelen en peren; zwarte bessen en frambozen zijn er met goed gevolg te telen.

Hoge zandgronden zijn in de zomer te droog voor onze vruchtbomen, daarom is het goed deze te bevloeien. Vóór het planten moet men flink wat organische stoffen in die grond brengen, bijv. in de vorm van ruige mest.

Harde lagen mogen in de grond niet voorkomen, d.w.z. in de bovenste meter niet, tenzij die harde laag onder de gemiddelde waterstand zit; men laat die gevoegelijk zitten, daar noch de wateropstijging, noch de waterafvoer er enige hinder van ondervindt. In zandgronden komen wel eens harde veenlagen voor; deze moeten gebroken worden, de wortels der bomen kunnen hier niet door. Het omwaaien der bomen door oppervlakkige beworteling is er een gevolg van.

Kleigronden zijn over het algemeen goed voor de fruitcultuur, doch ook weer niet alle. De mooiste grond zijn zavelachtige gronden; dit is grond, welke bestaat uit klei en zand innig met elkaar vermengd. Deze grond is rijk aan plantenvoedsel en voldoende doorlatend, iets wat vooral voor appels en kersen van grote betekenis is. In zware klei komen wel eens harde lagen voor, ontstaan door de met regenwater weggezakte fijne kleideeltjes. Bomen in zulk een grond geplant, laten dit na 8—9 jaren zien door een merkbaar kwijnend bestaan (gele, ziekelijke kleur van het blad). In 't begin groeien ze goed, doch na genoemde tijd komen de wortels in de harde lagen en gaan de bomen kwijnen.

Het spreekt, dat men **vóór het planten** al deze dingen moet onderzoeken; voorkomen is beter dan genezen!

In het algemeen kan men zeggen, dat gronden, welke lager liggen dan ± 0.60 m boven de gemiddelde waterstand voor appelen, peren en vooral voor kersen ongeschikt zijn; ook perziken houden van een dergelijke bodem niet.

De grond dient dus voor men gaat planten, goed bewerkt te worden; voor een fruittuin is diep spitten wel het allerbeste, zorgende dat de grond op zijn plaats blijft, d.w.z. de onderste steek moet beneden blijven, bovengrond dus boven houden. Nooit in een vast terrein alleen plantgaten maken, want dit worden watervergaarplaatsen, doch geheel los werken en als zulks door omstandigheden niet kan, zoals bijv. in grasland, dan stroken spitten, waar de bomen komen te staan.

't Is wenselijk een zekere **voorraad bemesting** te geven in de vorm van organische meststoffen en kunstmest; welke, hangt ge-

Onze vruchtbomen en bessen zijn op tijd verplant, dit komt de vruchtbaarheid zeer ten goede en verzekert de hergroei.

heel van de grondsoort af. Met de toediening van organische stoffen verbetert men de structuur van de grond en voorkomt daarmede het optreden van velerlei ziekteverschijnselen (gebreks- of voedingsziekten). Vooral op zandgrond is een jaarlijkse bemesting met stalmest noodzakelijk, welke men het best in November kan toedienen en boven op de grond moet laten liggen.

Pitvruchten, alsook steenvruchten houden van een kali- en fosforzuurrijke bodem, de laatste verkiezen daarbij nog al wat kalk. In de vorm van slakkenmeel verrijkt men de grond met fosforzuur en kalk; kali kan men geven o.a. als kalizout; overigens hangt de te geven hoeveelheid, alsmede de soort van mest ten zeerste af van de bodemgesteldheid, reden waarom het beter is zich door een deskundige te laten voorlichten.

Voor de bomen geplant worden, moeten de wonden der wortels ontstaan bij het rooien, even worden bijgesneden. Wat betreft het snoeien der takken het volgende: op zware kleigronden wil het voorkomen, dat bomen 't eerste jaar na planting weinig of niets groeien. Het zou verkeerd zijn zulke bomen te snoeien, omdat men dan in plaats van sterke takken zeer zwakke twijgjes zou krijgen op de plaats waar men zware nodig heeft; hier snoeit men dus een jaar na het planten. **Steenvruchten,** zoals pruimen en perziken, worden echter wel direct na het planten gesnoeid. Zij ontwikkelen in de eerste zomer reeds vrijwel normale scheuten. Op lichtere gronden, waar men een goede, directe hergroei kan verwachten, snoeit men de takken op de gewenste lengte. Men laat zijn bomen door een oordeelkundige snoeien, daar er anders in een ogenblik zeer veel bedorven kan worden.

De afstanden, waarop men plant, zijn voor stambomen-appels in de boomgaard 12—14 m, voor peren 10—12 m. Voor struikvormen variëren de maten zeer sterk en zijn afhankelijk van grondsoort, variëteit en onderstam.

Appelen op zwakke onderstam 3—8 m.
Appelen op zaailing onderstam 5—12 m.
Peren op zwakke onderstam 3—5 m.
Peren op zaailing onderstam 5—10 m.
Pruimen struikvorm zowel als hoogstam 5—8 m.

Leibomen zijn met 5—6 m tevreden, perziken hebben liefst wat meer ruimte. Op lichtere zandgronden kan men in het algemeen de maten wat kleiner nemen.

Staande snoeren, evenals horizontale, zijn bijzonder geschikt voor kleinere tuinen; men kan op een kleine ruimte veel variëteiten nemen, zodat het mogelijk is een groot gedeelte van het jaar eigen appelen en peren te hebben. Men moet dan echter trachten zich de snoei wat eigen te maken, wat met een beetje goede wil wel mogelijk is (zie bladzijde 95).

Ook in **fruitplantages** worden meer en meer staande snoeren, zowel appelen als peren aangeplant. Als **vollewindleiding,** doch ook als „wijkers" tussen struikvormen, heeft dit met groot succes

plaats. In het laatste geval laat men de snoeren loodrecht doorgroeien, en deze worden zo nodig voorzien van een stevige steunstok of paal.

Aan vollewindleidingen buigt men de boompjes wel in schuine richting, tot een hoek van 45 graden. Zulks remt enigszins de vegetatieve groei, doch bevordert ten zeerste de vruchtbaarheid.

Alleen fijnere, tegelijkertijd zeer vruchtbare variëteiten komen voor snoeren in aanmerking en behoren gekweekt te zijn op de daartoe geëigende onderstamtypen.

Afstand der boompjes op de rij 0,60 m—1 m, tussen de rijen 2 m—2,50 m. Deze ruime maat tussen de rijen is alleen in bedrijven nodig, waar men met grotere sproeimachines werkt.

Onderstammen onderscheidt men in sterke en zwakke groeiers. Voor peren gebruikt men zaailingen (sterke) en kweeperen. Voor appels zaailingen (sterke) en doucintypen. Met de verschillende eisen dienaangaande wordt door ons rekening gehouden. In verband hiermede is het gewenst bij eventuele bestelling op te geven of de grond hoog dan wel laag gelegen is.

Leibomen gebruikt men tegen gevels van huizen, muren, schuttingen, enz.

Aan deze vormen kan men mooie vruchten verkrijgen. Hiervoor komen vooral die variëteiten in aanmerking, die aan vrijstaande bomen niet tot volle rijpheid komen, of wel hun smaak niet krijgen door gebrek aan warmte. 't Is niet direct nodig, dat de appelen en peren aan de zuidkant staan van muur of schutting; deze plaats laat men liever vrij voor de perzik. Dit wil echter niet zeggen, dat ze geen zon nodig hebben, doch dat een Z.O. of een Z.W. kant van een muur ook nog zeer goed voor hen is. Ze hebben dan óf de morgen- óf de middagzon. Morellen kan men zeer goed kweken aan de noordkant der schutting.

Om tot 't laatst van September begin October bessen te kunnen genieten, plant men deze ook wel eens aan de noordkant van de muur, dan niet als struik, doch als U-vorm. **Pruimen** geeft men ook een goede plaats, gewoonlijk zijn de pruimen van leibomen lekkerder dan van vrijstaande bomen. Verder kan men allerlei aardige combinaties bedenken met de verschillende modellen van bomen. De omstandigheden kunnen echter van dien aard zijn, dat het beter is ter plaatse advies te geven.

De bestuiving der vruchtbomen staat op het ogenblik in het middelpunt der belangstelling. Daar de meeste onzer appelen-, peren- en pruimenvariëteiten zelfsteriel zijn, d.w.z. onvruchtbaar voor eigen stuifmeel, is onderlinge bestuiving noodzakelijk. Alle gelijkbloeiende variëteiten bevruchten elkaar echter nog lang niet, bijv. Goud Reinette kan worden bevrucht door Yellow Transparant, daarom behoeft het omgekeerde nog niet het geval te zijn.

De gehele bestuiving en bevruchting wordt beheerst door een groot complex uit- en inwendige factoren, waarbij volgens onderzoekingen der laatste jaren, het aantal chromosomen in de geslachtscellen naar alle waarschijnlijkheid een zeer belangrijke rol spelen.

Van pruimen is reeds iets meer bekend en verwijzen wij U daarvoor, zij het met de nodige reserve, naar pag. 101.

Uit de aard der zaak hebben wij op het gebied der beplanting veel ervaring en staan wij U gaarne met onze adviezen ter zijde. Vooral wanneer gewerkt wordt met „wijkers" moet worden gezorgd, dat de „blijvers" na het rooien der eerstgenoemde, niet zonder bestuivers zijn gebleven. Met de reeds bekende gegevens moet worden gewerkt. Een al te klein sortiment aanplanten lijkt ons voorlopig niet gewenst.

Op het grote nut van veel bijen tijdens de bloei, kan niet genoeg worden gewezen.

Ziekten en beschadigingen zijn de moeilijkheden, waarmede elke fruitkweker te maken heeft. Het ligt in de bedoeling in 't kort hier enkele van de voornaamste te behandelen.

Bladluizen in appel en peer zijn het best in de winter te bestrijden door een bespuiting met een 6—8 % **oplossing vruchtboomcarbolineum.** Dit dient te gebeuren in Februari voor de knoppen uitlopen. Hiermede doodt men de eieren, waarin de luizen overwinteren. Met deze bespuiting doodt men eveneens op de bomen voorkomend mos en ander ongedierte, dat zich in spleten en scheuren ophoudt.

Pruimen en kersen spuit men in Januari met 6 %, bessen met 7½ %. Perziken buiten in Januari met ten hoogste 5 %, in de kas reeds in December.

In de zomer kan men bladluizen bestrijden met 0,1 % nicotine van 95—98 % (1 ons nicotine op 100 l water) en met parathionhoudende middelen, of met een zeepspiritus-oplossing, ter sterkte van respectievelijk 2 en 1 %. Zeep oplossen in heet water, spiritus toevoegen als alles koud is. Deze bespuiting moet minstens twee keer plaats hebben, omdat er altijd luizen zijn, die men niet raakt. Daar luizen meestal aan de onderkant der bladeren voorkomen, is het dus nodig om van onderen af te spuiten. Bomen, waar veel bladluizen op voorkomen, groeien niet meer.

Bloedluizen zijn minder gemakkelijk te bestrijden. Inspecteert men echter geregeld de bomen, dan kan 't meevallen. Zodra men een plekje ziet, (te herkennen als witte wollige plekjes) moet men 't met een stevig kwastje insmeren met een sterke zeep-spiritus-oplossing, waaraan een weinig nicotine is toegevoegd. In grootbedrijven wordt gespoten met een nicotine-oplossing (1 ons nicotine van 95—98 %, op 75 tot 100 l water), of met parathionhoudende middelen.

In de winter kan men die plekken insmeren met onverdunde vruchtboomcarbolineum. Spuiten helpt wel, maar niet afdoende, omdat men niet alle spleten kan raken. Men treft ze gewoonlijk alleen op appelbomen aan en wel in de eerste plaats op wonden.

De **appelbloesemkever** (Anthónomus pomorum). Dit ongeveer 5 mm lange kevertje legt in de nog ongeopende bloemknoppen van de appels een eitje. De larven, welke na circa 8 dagen hieruit komen, voeden zich met de meeldraden en stampers, terwijl ze

ook aan de voet der bloemblaadjes knagen, zodat de knoppen zich niet openen, doch doof blijven. In deze gesloten knoppen vindt na 2 tot 3 weken de verpopping plaats, welke poptoestand 8 dagen duurt, waarna het ontstane kevertje door een inmiddels gemaakt gaatje uit het omhulsel ontsnapt en zich voedt met bladgroen, zonder merkbare schade aan te richten. In Juni-Juli zoeken de kevers een schuilplaats in schorsspleten e.d., zodat ze ook wel gevangen werden met vangbanden. Tegenwoordig spuit men de bomen, zodra de gemengde knoppen open komen met een D.D.T.-houdend middel. Percentage afhankelijk van de sterkte van het product.

De **perebloesemsnuitkever** (Anthónomus cintus). De levenswijze van deze kever wijkt sterk af van de appelbloesemsnuitkever. In Sept.—Oct. leggen de wijfjes haar eieren in de gemengde knoppen, zodat deze in het daarop volgende voorjaar niet uitlopen, doch afsterven en kale plekken op de takken veroorzaken. Van Februari af kan men de larven vinden in de knoppen, terwijl in Mei de verpopping plaats vindt en na 8 dagen de kever te voorschijn komt. Een bespuiting met D.D.T. in de eerste helft van September, zekerheidshalve in de tweede helft nog eens, geeft afdoende resultaten. D.D.T.-poeder bezoedelt de vruchten; D.D.T.-emulsie niet.

Wormstekigheid van appel en peer wordt veroorzaakt door de rups van de vlinder Carpocàpsa pomonèlla. Deze rups kan men vangen door vangbanden om de boom te binden, waarin deze rups, zodra zij volwassen is, een schuilplaats zoekt. Een bespuiting met een oplossing van 0,3 % loodarsenaat + 1 % sproeikalk omstreeks 20 Juni geeft eveneens goede resultaten. Voorts is een tweede bespuiting tegen half Juli noodzakelijk, soms nog een derde in Augustus.

Loodarsenaat mag tegelijk met spuitzwavel worden verspoten b.v. „Spersul", Thiovit e.d. Geeft geen verbranding.

Deze bespuitingen met loodarsenaat zijn tevens goed tegen de **perenringworm** (zigzaggangen in de stammen en dikke takken der peren).

Men zij voorzichtig met loodarsenaat, het is een zwaar **vergif**; niet spuiten als er bladgroenten onder de bomen staan, of deze met zakken, oude lakens e.d. tijdens het bespuiten afdekken.

Afgevallen ooft direct verzamelen en vernietigen.

Natuurlijke schuilplaatsen zoveel mogelijk wegnemen.

Ook de larve van de **appelzaagwesp** (Hoplocàmpa testudinea) is minstens even schadelijk, zij wordt dikwijls met de voorgaande verward. Het verschil is echter dat de eitjes van Carpocàpsa pomonella gelegd worden op de kleine vruchten en de rupsen zich dan in de vrucht boren, terwijl de Appelzaagwesp haar eitjes legt tijdens de bloei op het vruchtbeginsel. De bespuiting voor de appelzaagwesp moet dadelijk na de bloei plaats vinden met een H.C.H. (6.6.6.) houdend middel (indien geen onderteelt wordt uitgeoefend), Derrispoeder, Longocarpus of een parathionhoudend middel,

waarvan de fabrikant het percentage aangeeft. Het is gewenst deze bespuiting na 8—10 dagen te herhalen.

Heeft men dit alles verzuimd, zodat men in April—Mei rupsen heeft, dan onverwijld spuiten met loodarsenaat om de vretende rupsen te vergiftigen.

Kippen in fruittuinen en boomgaard zijn Uw trouwe helpsters; zij ruimen een massa ongedierte op!

Verzuim vooral niet **nestkastjes** op te hangen.

Dikwijls ziet men in het voorjaar gehele nesten met rupsen, soms vele in een boom. Dit zijn de z.g.n. **ringelrupsen.** De eitjes zijn in Juli gelegd door de vlinder van de ringelrups; ze zitten in een ring om de twijgen en zijn moeilijk te verschuiven. Een bespuiting met carbolineum helpt niet, omdat de vlinder de eitjes verzekerde met een lijmachtige stof, welke verhardt. In 't voorjaar komen de rupsen uit en kunnen een lengte bereiken van 5—5½ cm. Men herkent ze aan de witte streep over de rug.

De nesten kan men verbranden. Ook kan men spuiten met een arsenicumzout. Spreeuwen eten de poppen. Mezen zoeken de eitjes van de twijgen (nestkastjes). Met de snoei kan men de twijgen waaraan ringen voorkomen, wegsnijden.

De **schurftziekte** der appel- en pereboom (Fusiclădium dendriticum en F. pirinum). Deze zwammen tasten zowel bladeren, scheuten als vruchten aan. Aangetaste bladeren vertonen zwarte of groenbruine vlekken, meestal aan de bovenkant, maar perebladeren ook veel aan de onderkant. De vlekken zijn stervormig, enigszins onregelmatig van vorm. Komen er veel vlekken op een blad voor, dan valt dit ontijdig af. Men ziet dan ook meermalen vruchtbomen in Augustus reeds kaal staan, wat natuurlijk de opbrengst zeer zal schaden. Worden de scheuten aangetast, dan wordt dit nog erger, omdat ze er veelal aan sterven. De vruchten van peren lijden er meer van dan die van appels. Nauwelijks na het zetten der vruchten worden ze al aangetast en deze vallen dan spoedig af. De later besmette vruchten blijven wel hangen, doch scheuren erg. De verklaring is gemakkelijk, de geïnfecteerde plekken groeien niet door, de omringende gezonde delen wel. Peren verliezen dikwijls geheel hun smaak; appels niet, doch deze worden onooglijk.

Gelukkig is het door oordeelkundig bestrijden mogelijk, de ziekte geheel baas te blijven niet alleen, doch ze er zelfs uit te houden. Even voor het uitlopen der knoppen (laatst van Maart—half April), spuit men met koperoxychloride, hetgeen bij peren zowel als appelen voor een tweede keer direct voor de bloei wordt herhaald; na de bloei, alleen wanneer dit nodig is, met spuitzwavel.

De derde bespuiting vindt plaats binnen tien dagen, nadat de bloemblaadjes zijn afgevallen. Hiervoor gebruikt men ½ % „Thiovit", „Spersul" of een ander goede spuitzwavel met 0,3 % loodarsenaat. Verder in de zomer spuit men geregeld met ½ %

Struikvorm Bonne Louise d'Avranches.
Kwekerij „West-Friesland"

spuitzwavel. Men spuit **nimmer direct na sterke wind of hagel.** De bladeren zijn dan verwond en daardoor gevoeliger voor een bespuiting.

Ook al ziet men geen schurft, is spuiten toch gewenst; men voorkomt dan een aantasting. Variëteiten als Bonne Louise d'Avranches, Juttepeer, de appels Signe Tillish, London Pippin, Cox's Pomona enz. moeten meer gespoten worden dan minder vatbare variëteiten.

Tegen **monilia** rot in appelen, peren en pruimen, spuit men vlak voor de bloei met ¾ % koperoxychloruur.

Kanker in vruchtbomen is moeilijk te bestrijden. Zijn de bomen ernstig aangetast, dan is uitrooien het enige. Is de ziekte nog in een beginstadium, dan krabt men de kankerwonden uit en smeert ze daarna dicht met **„kankerdood"** of **„kankerverf".**

Middelen ter voorkoming zijn: ontwateren van te vochtige terreinen; matig zijn met stikstof, doch veel kali en kalk toedienen. **Aanschaffen van gezonde bomen is een vereiste.** Geen onnodige verwondingen maken; gemaakte wonden dichtsmeren met teer, menie, entwas of kankerdood.

Perziken worden in de zomer veelal aangetast door **„'t wit".** Zij krijgen het aanzien of ze bestrooid zijn met meel. Scheuten, bladeren en vruchten worden er door aangetast. Al heel spoedig houdt de groei op, zodat de vruchten van een minderwaardige kwaliteit worden. Gelukkig dat we in **zwavel** een goede helper hebben.

Zodra de perziken bladeren hebben, is het aanbevelenswaardig om ze met ventilatozwavel te bestuiven, doch alleen met zonnig weer. In 't groot doet men het met een verstuiver, 't kan echter ook met een gewoon jute zakje. Men loopt, dit als schuddend, langs de bomen. Een zeer dun laagje is voldoende, enige malen herhalen is goed.

Tevens wordt zwavel met succes gebruikt tegen **'t spint,** ook een ernstige vijand van de perzik, vooral in kassen.

Door zo nu en dan eens flink met water door de bomen te spuiten, voorkomt men eveneens het spint. In het algemeen worden perziken in kassen veel te droog gehouden, evenals op droge warme plaatsen buiten.

Tegen **krulziekte** der perziken spuit men circa 14 dagen voor het uitlopen der bloemknoppen met een 3 % oplossing van Californische pap. In kassen hebben perziken van deze ziekte niet te lijden, een bespuiting is dus niet nodig. Krulziekte is te herkennen aan de blaasvormig opgezwollen bladeren, welke geelachtig tot rood gekleurd zijn, en treedt in het voorjaar vlak na het uitlopen op.



Coelhorst.

APPELS

	Pluktijd	Gebruik
Anna Boelens. Ontstaan uit een kruising van Cox's Orange Pippin en Freiherr von Berlepsch. Vrucht platrond gevormd, bij de kelk een weinig geribd, middelmatig groot. De kleur der rijpe vrucht is goudgeel, de zonzijde donkerrood gevlamd. De smaak is fijn zachtzuur. Sterk groeiende boom, vroeg vruchtbaar.	Sept.-Oct.	Nov.-Dec.
Benoni. Deze appel komt in vorm en smaak met de Gravensteiner overeen, is dus zeer fijn van kwaliteit. Aan de zonzijde helderrood gestreept. Boom groeit sterk rechtop. Weinig vatbaar voor ziekten. Bijzonder vruchtbaar. Vruchten dunnen.	Eind Aug.	September
Bramley's Seedling. Zeer vruchtbare, goed groeiende gezonde boom. Grote vruchten van matige kwaliteit. Draagt ieder jaar.	October	Dec.-Mrt.

	Pluktijd	Gebruik
Beauty of Bath. Middelmatig grote, zeer platronde vruchten. Kleur goudgeel met helderrood aan de zonkant. Schil min of meer ruw. Kwaliteit der vruchten goed.	Juli-Aug.	Augustus
Campagner, zoete *(Zoete Bellefleur).* De meest bekende zoete appel. Zeer duurzaam. Een der beste zoete marktappels.	October	Dec.-Mrt.
Coelhorst. Vrucht middelmatig groot, rood gekleurd, kelk ingesneden, smaak zachtzuur. Boom groeit flink, is gezond en vruchtbaar.	October	Nov.-Dec.
Charles Ross. Een kruisingsproduct van Peasgood's Nonsuch en Cox's Orange Pippin. Het is een eerste klas tafelappel, welke in smaak iets met de Cox's Orange Pippin overeenkomt. Mooi bronsachtig gekleurde vrucht, welke zeer groot kan worden. Buitengewoon vruchtbare boom, groeit matig. Aanbevelenswaardig voor struikvorm en kleine vormen. Mag in geen fruittuin ontbreken.	Beg. Oct.	Nov.-Dec.
Codlin, Mank's. Matig groeiende boom, enorm vruchtbaar. Mooie gele appel, middengroot, tamelijk goede kwaliteit. Goed voor struikvorm.	Half Sept.	Sept.-Oct.
Coronation. Regelmatig gevormde ronde vrucht, aan de zonzijde mooi rood gekleurd. Goed groeiende gezonde boom. Vruchten van goede kwaliteit.	Eind Sept.	Oct.-Dec.
Cox's Pomona. Fris rood gekleurde vrucht. Smaak gewoon. Boom groeit goed en is vruchtbaar.	Eind Sept.	Oct.-Jan.

	Pluktijd	Gebruik
Carolina Red June (*Wilson's Red June*). Rode vruchten, middelmatig groot, smaak goed. Boom groeit behoorlijk goed, wordt niet groot, draagt reeds op jeugdige leeftijd. Verdient in het groot te worden aangeplant. Is veel beter dan Zigeunerin.	Begin Sept.	Sept.
Crimson Cox. Deze appel gelijkt in alle opzichten op de Cox's Orange Pippin, waarvan het een mutant is. Alleen de kleur der vruchten is mooier rood.	Eind Sept.	Nov.-Febr.
Dekker's Glorie. Een heerlijke zoete stoof- en handappel. Langwerpige, kleine vrucht, aan de zonzijde geheel rood. Vooral op latere leeftijd een zeer rijke drager. Boom groeit matig, niet vatbaar voor ziekten.	Eind Sept.	Nov.-Febr.
Dülmener Rosenapfel. Grote, ronde vrucht, soms wat geribd naar de kelk. Overwegend geel gekleurd met een blos naar de zonzijde. Smaak zeer goed. Boom groeit sterk.	1e helft September	Sept.-Oct.
Early Victoria. Een goede moesappel. De ronde vruchten zijn middelmatig groot en groen-geel van kleur. De boom groeit vrij goed, is gezond en buitengewoon vruchtbaar; ook reeds als zeer jonge boom. Als struikvorm aan te bevelen.	Juli-Aug.	Juli-Aug.
Ellison's Orange. Een appel, welke in velerlei opzichten op de bekende Cox's Orange Pippin gelijkt, waarvan het een kruisingsproduct is. De middelmatig grote vruchten zijn in vorm en kleur gelijk, doch de smaak iets minder dan van Cox's Orange Pippin. Gezondheidstoestand zowel van boom als vrucht beter. Vruchtbaarheid goed, mits weinig wordt gesnoeid.	Half Sept.	October

Voor de levering van grote aantallen o.a. voor boomgaarden en fruittuinen vrage men offerte. Al onze struikvormen appel, peer, pruim en kers worden op hogere stammen gekweekt.

Carolina Red June.

	Pluktijd	Gebruik
Freiherr von Berlepsch. Een bijzonder fijne appel met een zoetzure aromatische smaak. Vruchten middelgroot, een weinig geribt bij de kelk, aan de zonzijde heldergeel met rood. De boom groeit sterk en kenmerkt zich door een goede vruchtbaarheid. Als struikvorm en leiboom aan te bevelen.	October	**Dec.-Febr.**
Graham's Royal Jubilee. Een matig groeiende, doch zeldzaam vruchtbare boom. Ieder jaar beladen met mooie grote goudgele vruchten, welke echter niet fijn van smaak zijn, maar heerlijk voor moesappelen te gebruiken. Verdient als struikvorm te worden aangeplant.	Half Sept.	Nov.-Jan.
Gravensteiner. Middelmatig grote appel, enigszins langwerpig model. Geurig van smaak. Kleur groengeel en bijna geheel rood gestreept. Boom draagt niet vroeg en onregelmatig.	Half Sept.	Sept.-Nov.

	Pluktijd	Gebruik
Golden Delicious. Boom groeit goed, vroeg en rijk dragend, regelmatige oogst. Sterk vatbaar voor schurft. Het jonge blad bezit een groengele kleur, later groener. Vruchten zijn klein tot middelmatig groot en goed van kwaliteit, terwijl de kleur groen-geel, na bewaring geel wordt. Waaien niet gemakkelijk af.	October	Jan.-Maart
Groninger Kroon. Tamelijk grote, langwerpige ronde appel. Mooi rood aan de zonzijde. Goed van kwaliteit. Gezonde, sterk groeiende, rijkdragende boom. Wordt als boomgaardboom de laatste jaren nog al aangeplant.	Eind Sept.	Oct.-Febr.
Glorie van Holland. Een variëteit welke zeer vruchtbaar is. Middelmatig grote, kegelvormige vrucht. Geel-groen van kleur. Aan de zonzijde zwakke, soms sterke blos. Smaak is goed. Boom groeit sterk en breed uit.	Eind Sept.	Oct.-Febr.
Ingrid Marie. Vruchten donkerrood, middelmatig groot, vruchtvlees wit, aromatisch van smaak. Deze variëteit is van Deense oorsprong en waarschijnlijk een zaailing van Cox's Orange Pippin. Boom is gezond en zeer vruchtbaar.	October	Oct.-Mrt.
James Grieve. Goed groeiende boom, brede kroon, rijkdragend. De vruchten zijn regelmatig gevormd; aanvankelijk groen, later geelrood gekleurd. Kwaliteit zeer goed. Vruchtvlees knappend, erg saprijk.	Sept.	Sept.-Oct.

	Pluktijd	Gebruik
Jonathan. Bekende Amerikaanse appel. Kleine tot middelmatig grote vrucht, iets hoog. Groene kleur met vlammend rood. In Amerika feller gekleurd. Vruchtvlees tamelijk vast, licht zuur, goede smaak. Boom wordt matig groot en vormt slap hout. Draagt vroeg en rijk en is gezond. Luwe standplaats gewenst. Zeer vruchtbare grond noodzakelijk, daar anders de vruchten te klein blijven. Ruim snoeien om de kleur te bevorderen.	October	Oct.-Mei
Kesters Wijnzuur (Uiltje). Platronde, middelmatig grote, iets gekleurde vrucht. Schil bijna glad. Zeer krachtige groei. Kerngezond. Heeft bijna nooit last van kanker. Vruchtbaarheid vrij goed tot zeer goed. Draagt bijna jaarlijks. De vrucht smaakt lekker. Beste handappel. Goede boomgaardboom.	Half Sept.	Oct.-Nov.
Laxton's Superb. Als zaailing van de bekende Cox's Orange Pippin heeft deze variëteit vele kenmerkende eigenschappen van het oudertype behouden. Groei en ontwikkeling wat sterker, iets minder vatbaar voor ziekten. De vruchten zijn groter, hebben een mooie gele kleur met rood-bruine blos aan de zonzijde. Smaak minder fijn dan C.O.P. Vruchtbaarheid goed, ook bij jonge bomen.	Beg. Oct.	Nov.-Jan.
Laxton's Fortune. Boom groeit tamelijk sterk. Vruchtbaarheid zeer goed. Vrucht middelmatig groot, groen met sterk rode blos. Smaak aromatisch, zachtzuur. Zeer sappig.	1e helft September	September
Laxton's Herald. Gezond groeiende, zeer vruchtbare boom, welke middelmatig grote vruchten voortbrengt, die zeer fijn, zachtzuur van smaak zijn en bovendien erg sappig. Kleur der vruchten bijna geheel rood.	1e helft September	September

Glorie van Holland. Kwekerij „West-Friesland".

Lemoenappel.	Pluktijd	Gebruik
Een Lunterse zaailing. Komt zeer veel met de Goud-Reinet overeen. Regelmatig sterkgroeiende boom, geschikt voor hoogstam en struikvorm. Kwaliteit der vrucht goed.	October	Dec.-Febr.

	Pluktijd	Gebruik
Lombart's Calville. Boom groeit tamelijk sterk en vormt een opvallend regelmatige, flinke kroon. Draagt vroeg, regelmatig en zeer goed. De kleur der middelmatig grote vruchten is geelgroen, later in fraai geel overgaand. Smaak is zachtzuur. Goede handappel tot in Maart. Vrij vatbaar voor late schurft.	October	Jan.-Mrt.
Lunterse Present. Vrucht van goede kwaliteit. Gelijkt in vorm en grootte enigszins op de Present of England. De groei is echter veel beter. Is geschikt voor hoogstam en struikvorm.	October	Nov.-Febr.
Mr. Gladstone. Een vroege appel van zeer goede kwaliteit. Haar middelmatig grote vruchten zijn mooi rood gekleurd. Dit is een factor, welke de verkoopwaarde der vruchten verhoogt. De boom groeit goed en is vruchtbaar. Vooral als struikvormen aan te planten.	Eind Juli	Augustus
Notarisappel. Eveneens een Lunterse zaailing. Goed groeiende boom, welke voor alle vormen geschikt is. Draagt mooi gekleurde kegelvormige vruchten van een zeer goede kwaliteit. Op sommige gronden nog al last van kanker.	Half Sept.	Oct.-Dec.
Peasgood's Nonsuch. Platronde, buitengewoon grote appel van zeer goede kwaliteit. Vruchten kunnen 6—7 ons zwaar worden. Boom groeit matig en heeft helaas veel last van kanker. Draagt vroeg. Geschikt voor struikvorm en leiboom.	Eind Sept.	Nov.-Febr.
Pater van den Elsen. Deze appel is een zaailing van de Goud Reinette. De vrucht is groot, rond van vorm, zeer mooi rood gekleurd en zacht zuur van smaak. Boom draagt goed, groeit fors en is getooid met donkergroen, grof blad, hetwelk naar beneden is omgebogen.	October	Dec.-Febr.

Struikvorm appel. Rooien voor verzending.

	Pluktijd	Gebruik
Pippin, London (London Calville). Lijkt uiterlijk veel op de Witte Winter Calville; doch meer geel van kleur en iets minder geribd. Boom draagt zeer vroeg en overvloedig. Groei matig. Zeer vatbaar voor schurft. Smaak zeer fijn. Goed voor koelhuis. Aanplanten als struikvorm en vormboom.	October	Jan.-Mei

Palmet candelaber „Goud Reinet"
In Amsterdam geplant najaar 1955, bloei voorjaar 1956

	Pluktijd	Gebruik
Pippin, Blenheim. Zeer sterk groeiende boom. Draagt pas op latere leeftijd, doch dan regelmatig. Vrucht platrond gevormd, zeer groot, geurig van smaak. In grotere particuliere tuinen is deze variëteit onmisbaar.	Begin Oct.	Nov.-Dec.
Pippin, Cox's Orange. Vrucht niet groot, rond van vorm. Kleur geel met bruin-rood overdekt. Een der fijnste tafelappels, welke, niettegenstaande de boom nog al kankerachtig is, veel wordt aangeplant, vooral op niet te natte gronden, welke wel vruchtbaar moeten zijn. De boom is zeer vruchtbaar. Geschikt bij voorkeur als struikvorm en leiboom. Erg gevoelig voor Calif. pap.	Eind Sept.	Nov.-Febr.
Pippin, Allington. Boom is gezond, krijgt geen grote omvang, is vroeg vruchtbaar. De smaak der middelmatig grote, kegelvormige vruchten is aromatisch en zachtzuur, de kleur geel met wat rood en gestreept.	October	Nov.-Febr.
Pippin, Ribston's. Deze appel kan met succes op hogere gronden worden aangeplant. Op te vochtige gronden veel last van kanker. De boom groeit goed en is zeer vruchtbaar. Haar vruchten zijn heerlijk van smaak en tamelijk groot. Voor particuliere tuinen als struikvorm en leiboom aan te bevelen.	Begin Oct.	Dec.-Mrt.
Present van Holland. Deze, op Present of England gelijkende appel, is ontstaan uit een kruising van Present of England en Brab. Bellefleur. Vruchten hebben mooie, rode blos aan de zonzijde. Boom is gezond en vroeg vruchtbaar.	Half Oct.	Mrt.-Mei

	Pluktijd	Gebruik
Princesse Noble (Noblesse). Een variëteit, welke weer meer wordt aangeplant. Boom wordt matig groot, is vruchtbaar, doch draagt meestal niet rijk. Vrucht is groengeel, min of meer gestreept, hoog van vorm, middelmatig groot, zeer fijn van smaak. Lijdt sterk aan schurft en kanker, zodat goede ziektebestrijding noodzakelijk is. Verkiest bij voorkeur zavel- of zeer goede zandgrond.	Eind Sept.	November
Pfirsichroter Sommerapfel. Een vroege appel, welke de laatste jaren zeer veel wordt aangeplant. Draagt mooie, rood gekleurde vruchten, middelmatig groot en van enigszins konische vorm. De boom is op een niet al te natte bodem gezond en zeer vruchtbaar. Draagt op 2-3 jarige leeftijd reeds. De smaak is kruidachtig zacht zuur. Is vooral als struikvorm aan te bevelen.	Augustus	Augustus
Present of England. In enkele streken van ons land een overbekende appel. Vrucht groot, langwerpig, goede smaak, zeer groot klokhuis, aanvankelijk groen, later geel gekleurd. De boom vormt slap hout, hangt daarom sterk, minder geschikt als struikvorm.	October	Dec.-April
Reinette, Ananas. Vrucht middelmatig groot, soms klein. Regelmatig rond van vorm. Kleur aanvankelijk groen, later goudgeel, bezaaid met groene stipjes. Een geurige, zeer fijne tafelappel; wordt door velen als de lekkerste gekwalificeerd. Groei matig, doch vormt stevig hout. Is vruchtbaar en als struikvorm aan te bevelen. Niet voor zeer natte gronden.	October	Dec.-Mrt.
Reinette, Goud (Rode). Komt in alles met gewone Goud-Reinette overeen; vrucht is echter minder goed te bewaren.	October	Dec.-Febr.

Struikvorm Conférence.

Kwekerij „West-Friesland"

	Pluktijd	Gebruik
Reinette, Goud (Schone van Boskoop). Een der meest bekende appelen, welke zeer groot kunnen worden. Wordt in het groot zeer veel aangeplant. Vruchtvlees is geelwit van kleur en enigszins los; de smaak is scherp zuur, zeer goede kwaliteit. Boom verlangt een goede klei- of zandgrond, met een niet te hoge waterstand, anders treedt spoedig kanker op. Zeer geschikt voor hoogstam en struikvorm	October	Dec.-April
Reinette von Zuccalmaglio. Eerste klas tafelappel. Middelmatig grote, ronde vruchten, citroengeel van kleur met rode stippen. De boom groeit vrij goed, is gezond en draagt rijk en vroeg. Vooral aan te planten als struikvorm en leiboom.	Begin Oct.	Nov.-Febr.
Reinette, Oranje. Boom middelmatig groot, goed gezond, sterk vruchtbaar. Vruchten groen, later geel met soms een enkele rode streep, rond van vorm, smaak zachtzuur, waaien niet gemakkelijk af. Verdraagt geen Calif. pap en spuitzwavel.	October	Nov.-Mrt.
Reinette de Canada. Platte, geribde, grote vrucht. Smaak zeer fijn. Verlangt warme standplaats en niet te natte bodem. Aanplanten als vormboom en struikvorm.	October	Jan.-April
Reinette, Zoete Grauwe. Regelmatig ronde vrucht, klein, ruwe bruin-grauwe schil. Zeer goede kwaliteit. Boom groeit flink en is vruchtbaar. Weinig hinder van ziekten.	October	Nov.-Mrt.

Plaats tijdens de bloei der vruchtbomen voldoende bijenvolken in uw fruitplantage.

	Pluktijd	Gebruik
Rode Bloemee. Prima, bekende, vroege zoete appel met gladde schil, maar mooi rood gekleurd, in tegenstelling met de gewone groene Bloemee. Een vrij krachtig groeiende boom. Vrij gezond en vruchtbaar. Draagt regelmatig. De smaak is best.	Begin Sept.	Sept.-Dec.
Rode Tulpappel. Deze variëteit is zo goed als geheel uit de cultuur verdwenen. Slechts een enkele keer treft men ze nog aan. De vrucht is middelmatig groot, langwerpig, bij goede belichting geheel rood gekleurd, heerlijk zachtzuur van smaak. Als vele vroege appels, spoedig melig. Boom groeit matig en is zeer vruchtbaar. Als struikvorm en hoogstam aan te bevelen.	Half Aug.	Half Aug.



Freiherr von Berlepsch.

Voor levering van grote aantallen, o.a. voor boomgaarden en fruittuinen vrage men offerte.

Emile d'Heyst. Kwekerij „De Dracht"

	Pluktijd	Gebruik
Signe Tillish.	October	Nov.-Jan.

In Nov.-Jan. wel een der lekkerste appels. Mooie grote vrucht, enigszins geribd en geel van kleur. Lijkt op Witte Winter-Calville. Geschikt om te koelen, blijft dan tot April goed. Boom groeit goed, is echter nogal vatbaar voor schurft, wat men er door spuiten met Californische pap wel uit houdt (zie bladzijde 60).

Onze fruitkwekerij „West-Friesland" in bloei.

	Pluktijd	Gebruik
Sterappel. Mooie rode, middelmatig grote appel, bezaaid met witte stipjes. Vorm rond, soms iets platrond. Goede marktvrucht. Wordt als boomgaardboom veel gevraagd. Is voor zandgronden minder geschikt dan voor kleigrond. Bloeit laat, daarom weinig hinder van nachtvorst. Vrucht zit nog al los, valt daardoor spoedig af. Steile groeier.	Begin Oct.	Nov.-Jan.
Schellinkhouter. Een appel van zeer goede kwaliteit. De vrucht is middelmatig groot, langwerpig, lichtrood gekleurd, zeer sappig en doet in smaak aan de bekende Princesse Noble denken, waarvan het dan ook een zaailing is. Gezonde, goed groeiende boom. Vruchten sterk dunnen. In West-Friesland een goede bekende.	Half Sept.	Oct.-Nov.
Transparante de Croncels. Dit is in October wel een der fijnste appelen. De kleur is dan goudgeel soms aan de zonzijde een weinig gekleurd. Haar vorm is mooi rond, soms iets plat. Boom groeit goed en draagt rijk, is wat vatbaar voor Fusicladium. Bladeren zijn gevoelig voor Californische pap. Vooral goed voor struikvormen. De vrucht laat zich zonder te beschadigen moeilijk verzenden.	Half Sept.	Sept.-Nov.
Winston *(Wintercheer).* Deze middelmatig grote appel is zeer duurzaam. De kleur is matbruin-groen, doch wordt met bewaren geelbruin. Is zeer vruchtbaar en gezond. Groeit middelmatig sterk.	Oct.	Jan.-April
Yellow Transparant. Soms kan men de eerste vruchten reeds in 't laatst van Juli plukken; zijn direct voor 't gebruik goed. Kleur is wit-geel. Smaak is goed. Boom draagt vroeg en is zeer vruchtbaar, groeit tevens uitstekend. Vruchten zijn tamelijk groot, kunnen 2—2½ ons zwaar worden. Boom heeft nog al last van kanker; men plante hem daarom op goed doorlatende gronden, vooral als struikvorm en leiboom.	Begin Aug.	Augustus

	Pluktijd	Gebruik
Zigeunerin. Een geheel donkerrood gekleurde vrucht. Onregelmatig rond van vorm, groot van stuk. Slechts matig van smaak, tamelijk zacht zuur. Laat men de vruchten geheel doorrijpen aan de boom, dan is de smaak goed. Boom groeit langzaam tot matig, doch blijft gezond. Vruchtbaarheid zeer goed.	Begin Sept.	Sept.
Zoete Ermgaard. Boom groeit goed, begint tamelijk laat te dragen, doch dan vruchtbaar. Vrucht middelmatig groot, langwerpig, bijna geheel rood gestreept. Gezonde boomgaardboom.	October	Jan.-April
Zoete Kroon. Zeer gezonde boom. Vormt een kroon van middelmatige omvang. Is vroeg vruchtbaar. Vrucht klein tot middelmatig groot van stuk, roodgestreept. Smaak zacht zoet, goede kwaliteit.	October	Nov.-Febr.

Rode Goud Reinette.

PEREN

	Pluktijd	Gebruik
Bergamot, Dubbele (Blanke Diamant). Sterk groeiende, vruchtbare boom. Goed voor alle vormen. Vruchten van goede kwaliteit.	Half Sept.	Sept.-Nov.
Beurré Alexander Lucas. Grote tot zeer grote vrucht, kegelv. rond, groenachtig geel, bruinkleurig gevlekt. Vrucht zeer sappig en van goede kwaliteit. Goed als struikvorm en leiboom. Zeer vruchtbaar.	Half Oct.	Nov.-Dec.
Beurré d'Amanlis. Boom is kenbaar aan het hangende hout. De vrucht is vrij groot en langwerpig kegelvormig. Kleur groengeel, aan de zonzijde dofrood. Zoetzuur van smaak. Rijke drager.	Begin Sept.	September
Beurré Beucke. Onregelmatig stomp gevormde peer, met groen-grijze, later in groen-geel overgaande kleur. Middelmatig groot. Lange steel. Smaak goed. Boom groeit goed, is zeer gezond en vruchtbaar. Waait niet gemakkelijk af. Verdient veel te worden aangeplant.	Half Sept.	Eind Sept.
Beurré Lebrun. Buitengewoon vruchtbare variëteit. Gezonde boom. De gemuskeerde vruchten zijn groot, hebben een groengele, later meer gele kleur en zijn langwerpig.	Eind Sept.	October

	Pluktijd	Gebruik
Beurré Clairgeau. Geeft vruchten met grofkorrelig vruchtvlees en van zeer lang model. De kleur is bijna geheel helderrood met gele ondergrond; groei zeer sterk en steil; gesteltakken vertakken weinig. Is zeer vruchtbaar en draagt regelmatig. Als struikvorm aan te bevelen, vooral voor kleigronden.	October	Nov.-Dec.
Beurré Giffard. Een der fijnste vroege peren, wordt om de smaak wel „Blanke Jut" genoemd. Aan te planten als struikvorm. Kleur der vrucht groengeel, en middelmatig groot.	Eind Juli	Juli-Aug.
Beurré Hardy. Een peer van zeer goede kwaliteit; smeltend; middelmatig groot en roestkleurig. Goed gezonde boom met een flinke groei. Draagt niet vroeg, maar begint soms toch al op 6—7-jarige leeftijd en dan ook rijk. Er zijn echter streken waar men er langer op moet wachten. Vooral goed als struikvorm en als leiboom.	Half Sept.	October



Winterrietpeer.

	Pluktijd	Gebruik
Bon Chrétien Williams. De boom wordt matig groot en draagt meestal goed. De vruchten zijn sterk gemuskeerd en hebben fijn wit vruchtvlees. Hun kleur is goudgeel met roest, ze zijn behoorlijk groot en stomp afgeplat. Vatbaar voor schurft.	Eind Aug.	September
Bonne Louise d'Avranches. Een eerste klasse tafelpeer met een geurige smaak. Wordt tamelijk groot, heeft een bronsgroene kleur met rood aan de zonzijde overdekt. Mag in geen liefhebberstuin ontbreken; wordt ook in het groot aangeplant. Boom groeit goed, is echter vatbaar voor schurft. Vooral aan te bevelen als struikvorm en leiboom. Eist een krachtige grond.	Half Sept.	October
Brederode. Stoofpeer van zeer goede kwaliteit. Boom groeit goed, draagt overvloedig en heeft weinig hinder van ziekte. De vrucht is Bergamotvormig en middelmatig groot.	October	Nov.-Mei
Calabasse de Tirlemont. Men herkent de vruchten direct aan hun lange vorm en roestbruine kleur, enigszins gespikkeld. Goed groeiende en tevens rijkdragende variëteit. Kwaliteit der vruchten goed.	Begin Oct.	November
Comtesse de Paris. Deze peer verlangt een warme standplaats. Zo men dit deze peer niet kan geven, is aanplanten niet gewenst, daar hij dan smakeloze vruchten geeft. Voldoet men echter aan bovengestelde eis, dan oogst men meestal vruchten, welke fijn van smaak worden na een paar maanden gelegen te hebben. Vruchtvlees is fijnkorrelig en sappig. Peer wordt tamelijk groot en is lichtgroen van kleur. Een der lekkerste winterhandperen. Boom groeit goed en gezond, is rijkdragend. Aan te bevelen als struikvorm en vooral als leiboom.	Eind Oct.	Dec.-Jan.

Saint Remy. Kwekerij „West-Friesland".

	Pluktijd	Gebruik
Clapp's Favourite. Een der beste vroege peren van een goede kwaliteit, wordt tamelijk groot, is geel van kleur, aan de zonzijde rood gestreept. De boom verlangt een vruchtbare, niet al te zware bodem; groeit zeer goed en is gezond. Zeer geschikt als struikvorm, doch ook als leiboom, waaraan ze dan ook prachtige vruchten levert.	Half Aug.	Aug.-Sept.

	Pluktijd	Gebruik
Conférence. Grote vrucht met lange hals. Groen van kleur met rode stippen, vruchtvlees om het klokhuis rose gekleurd en zonder stenige korrels, heerlijk smeltend en fijn zoet van smaak. Goed voor koelhuis. Om velerlei redenen ongetwijfeld een der beste handperen. Bovendien zeer vruchtbaar. Goed voor struikvorm en leiboom.	Half Sept.	Oct.-Nov.
Doyenné du Comice. Matig grote, ronde, geelgekleurde (aan de zonzijde bruine) vrucht. Zeer sappige, fijne peer, welke in geen particuliere tuin mag ontbreken. Groeit langzaam; is zeer vruchtbaar, doch draagt matig; bij korte vruchthoutsnoei echter voldoende. Aan te bevelen als struikvorm en leiboom.	Begin Oct.	Eind Oct.-Nov.
Durandeau (Poire de Tongres). Langwerpig, grote, naar boven smal toelopende peer. Aan de zonzijde mooi gekleurd, verder bruin-geel. Een peer met een heerlijk frisse smaak en van goede kwaliteit. Is voor hoge gronden minder geschikt, doch aan te bevelen voor voedzame gronden. Deze peer vooral niet te laat plukken. Goed voor alle vormen.	Eind Sept.	Oct.-Nov.
Duchess Williams (Pitmaston Duchess). Een zeer bekende en gezochte peer, met een enigszins zure smaak. De vruchten kunnen verbazend groot worden (soms 7½ ons zwaar) en zijn groen van kleur, later geel. Men laat deze variëteit goed aan de boom rijpen, wat de smaak zeer ten goede komt. Boom groeit sterk en gezond, draagt later geregeld en rijk. Als struikvorm aan te bevelen.	Eind Sept.	Oct.-Nov.

	Pluktijd	Gebruik
Eva Baltet. Tafelpeer van eerste kwaliteit, welke een stompe kegelvormige bultige vorm heeft. Wordt tamelijk groot en heeft een dofrode kleur. Boom groeit goed, is zeer gezond, draagt tamelijk vroeg. Aanbevelenswaardig als struikvorm en leiboom.	Eind Sept.	Oct.-Nov.
Emile d'Heyst. Wordt de laatste jaren veel aangeplant. Vrucht is tamelijk groot. Roestkleurig uiterlijk. Smaak voortreffelijk. Boom is gezond en vruchtbaar en kan als struikvorm worden aanbevolen. Vruchthout dunnen.	October	November
Fondante de Charneux (Légipont). Een waardevolle peer, in Limburg reeds overbekend. De vrucht is heerlijk zoet en sappig; vrij groot, kegelvormig en een weinig bultig. Kleur groen-geel, aan de zonzijde matrood. Een gewilde peer voor de handel. Een der beste voor het koelhuis. Mag echter ook in geen particuliere tuin ontbreken. Aan te planten als struik en vormboom.	Eind Sept.	October
Franse Wijnpeer. Zeer vruchtbare peer van goede kwaliteit. Middelmatig groot. Groen-geel gekleurd. Boom groeit goed, zeer weinig schurft.	Begin Sept.	September
Gieser Wildeman. Is mèt de Winterjan een der beste stoofperen, daarom ook erg gewild. Goed gezonde, rijkdragende boomgaardboom.	October	Dec.-Mrt.

	Pluktijd	Gebruik
Herzogin Elsa. Matig grote, groengele vrucht, aan de zonzijde roodachtig getekend. Rijkdragend. Geurig van smaak. Goed voor struikvorm.	Half Sept	October
Juttepeer. Een algemeen bekende en gewilde peer; is dan ook in die tijd een der lekkerste peren. Boom draagt echter niet vroeg, maar later rijk. Erg vatbaar voor schurft. Goed voor hoog- en halfstam. De moderne bestrijdingsmiddelen tegen schurft maken het o.i. mogelijk op bescheiden schaal deze peer aan te planten.	Begin Sept.	September
Josephine de Malines. Vrucht klein, rond tot kegelvormig, erg afgeplat bij de kelk, groenachtig-geel gekleurd. Smaak heerlijk zoet, min of meer geurig, zeer sappig en smeltend. Een der beste late handperen, waait niet gemakkelijk af. Als struikvorm geschikt.	Eind Oct.	Dec.-Febr.
Kruidenierspeer (Oomskinderpeer). Een peer van goede kwaliteit. Klein en stomp van vorm. Geel-groen van kleur. Boom groeit gezond en is zeer vruchtbaar.	Begin Aug.	Augustus
Le Lectier. Late peer met fijne smaak, erg sappig. Groen van kleur, wordt met liggen geel. Eigenaardige vorm. Enigszins hoekig naar de kelk. Warme standplaats.	Begin Oct.	Nov.-Dec.
Marguérite Marillat. Zeer grote, onregelmatig gevormde vrucht. Scheefstaande steel. Kleur geel met hoogrode blos. Smaak goed. Boom groeit langzaam tot matig, is goed vruchtbaar.	Begin Sept.	September

	Pluktijd	Gebruik
Nec plus meuris (Beurré d'Anjou). Bleek groen-gele middelmatig grote, ronde peer. Vruchtvlees is smeltend, zoet, geurig van smaak en zeer sappig. Zeer goede late handpeer. Boom groeit langzaam, is zeer vruchtbaar. Warme standplaats gewenst.	October	Dec.

Beurré Alexander Lucas. Kwekerij „West Friesland".

	Pluktijd	Gebruik
Nouveau Poiteau. Langwerpige, buikige, grijsgroene vrucht van matige kwaliteit. Boom groeit goed, indien hij niet al te veel wordt aangetast door de bladvlekziekte (Septoria piricola), waarvan deze variëteit bijna regelmatig last heeft. Aan te bevelen als struikvorm.	Eind Sept.	Oct.-Nov.
Précoce de Trévoux. Een vrucht van middelbare grootte, rond kegelvormig; geel, aan de zonzijde rood gekleurd. Zeer fijne vroege peer. Boom groeit goed, is vrij goed gezond en zeer vruchtbaar. Vrijwel onvatbaar voor nachtvorstschade. Wordt in 't groot veel aangeplant als struikvorm; ook goed als leiboom. Deze peer vooral niet te vroeg plukken.	Eind Aug.	Aug.-Sept.
President Loutreuil. Boom groeit goed, is buitengewoon vruchtbaar, jonge scheuten nogal opvallend rood getint. Bloesem rood in knopvorm. De roestbruin tot groene, kegelvormige, middelmatig grote vruchten zijn zoet en hebben smeltend vruchtvlees. Laat zich uitstekend koelen.	Eind Sept.	Oct.-Nov.
Saint Rémy. Een zeer goede, late stoofpeer. Gelijkt op Pondspeer, doch is duurzamer. Weinig ziekte. Zelfs goede resultaten op natte gronden.	October	Dec.-Mei
Seigneur d'Esperen. Kleine, tot middelmatig grote, ronde peer; grijsgroen van kleur, aan de zonzijde gekleurd. Fijne herfstpeer. Mag niet te laat geplukt worden, omdat ze dan wat gemuskeerd is. Voor alle vormen goed, vooral als struikvorm.	Begin Sept.	Sept.-Oct.

	Pluktijd	Gebruik
Suikerpeer (Noord-Hollandse). Flinke rondgevormde vrucht, met gele hoofdkleur. Tamelijk goede kwaliteit. Geschikt om te steriliseren, daar zij haar blanke kleur behoudt. Goed gezonde, sterk groeiende, zeer vruchtbare boom. Goed voor hoog- en halfstam.	Eind Aug.	Aug.-Sept.
Soldat Laboureur. Middelmatig grote, langwerpige vrucht met een geelgroene kleur. Eerste klasse tafelpeer. Eist een voedzame grond. Voldoet als struikvorm en leiboom uitstekend.	Begin Oct.	Oct.-Nov.
Triomphe de Vienne. Enigszins langwerpige afgestompte vrucht van zeer goede kwaliteit. Kleur roestbruin. Groeit goed en draagt rijk, behoudens een enkel jaar. Aan te bevelen als struikvorm en leiboom.	Begin Sept.	September
Winterjan (Kleipeer, Steenpeer). Zoals reeds eerder is opgemerkt, een der beste stoofperen. Groeit matig, doch is zeer vruchtbaar. Bij voorkeur aanplanten op vruchtbare gronden. Goed voor windkering langs fruittuinen enz. Vooral als hoog- en halfstam.	Eind Oct.	Nov.-April
Winterlouwtje. Zeer langwerpige geel-groene stoofpeer. Prima van smaak. Boom groeit goed en draagt zeer rijk.	October	Dec.-Febr.
Winterrietpeer. Een ouderwetse stoofpeer, welke men niet veel meer aantreft. Ze behoort echter tot de fijnste. Vrucht groot, langwerpig, geen dunne hals. Bruine kleur met grijze stippen. Bomen groeien sterk, verdragen geen natte bodem. Vruchten worden met liggen geel.	Begin Oct.	Dec.-Febr.
Zwijndrechtse Wijnpeer. Boom wordt middelmatig groot, groeit als jonge boom sterk. Vruchtbaarheid zeer goed, ook bij jonge bomen. De vruchten zijn peervormig en slechts matig groot, soms zelfs klein. De kleur is overwegend groen met brons. Smaak heel goed. Is als struikvorm en hoogstam goed en voldoet op vrijwel alle gronden.	October	Oct.-Nov.

Betreffende de gegeven pluktijden diene het volgende. Het is niet mogelijk om de tijd van plukken met enige zekerheid op te geven, daar zoveel factoren, vooral weersinvloeden, ieder jaar verschillend kunnen zijn. Daarom moet men de opgegeven tijden als een aanwijzing beschouwen en lette men op het volgende. Ziet men dat een zekere variëteit enkele gezonde vruchten laat vallen en zitten de overige erg los, zodat ze bij enige aanraking in de hand blijven liggen, dan plukke men deze voor zover ze los zitten; de overige kan men nog wat laten hangen, deze rijpen nog wat aan en worden dikwijls nog heel wat groter; vooral de Yellow Transparant plukt men in verschillende keren. Goed uitgegroeide, op tijd geplukte vruchten zijn het fijnst. **Perziken en pruimen,** vooral perziken moeten zeer voorzichtig geplukt worden. Met de volle hand omvat men de vrucht, welke, indien ze rijp is, in de hand blijft liggen. Tevens zij men er op gewezen dat het binden en nijpen van leibomen, in 't bijzonder perziken en pruimen, met zorg en de nodige vakkennis moet geschieden.

Triomphe de Vienne

Zowel van appelen, peren als pruimen zijn in bijna alle vormen enige uitzonderlijk zware maten aanwezig. Prijzen worden op aanvraag verstrekt

Laat geen muur- of schuttingvlakte onbenut.

SNOEIEN VAN SNOEREN EN PALMETTEN.

Zonder snoei zou een vormboom spoedig tot zijn natuurlijke staat terugkeren. Men beoogt met de snoei de vruchten zo dicht mogelijk bij de gesteltakken te houden. We onderscheiden winter- en zomersnoei.

WINTERSNOEI wordt uitgevoerd in Februari-Maart.

Op vruchtbomen komen verschillende organen voor, die men met het oog op de snoei moet kennen. Een korte beschrijving dezer organen laten we volgen:

1e. **De blad- of okselknop.** Hieruit groeit meestal een bebladerde scheut.

2e. **De spoor.** Een kort orgaan, ontstaan uit een bladknop. Scherp puntig, 3—5 bladeren in een krans. Wordt niet gesnoeid.

3e. **De gemengde knop** (bloemknop). Krans van 5—7 bladeren. In de winter tamelijk dik en lichtbruin tot bruin gekleurd. Hieruit ontstaan bloemen en bladeren.

4e. **De beurs.** Zeer dik, kort, vlezig orgaan, waaraan de vrucht voortkomt. Het heeft de gunstige eigenschap korte twijgjes en(of) sporen voort te brengen, waaraan later weer de vruchten komen. De beurs dus niet mee afplukken.

5e. **Het vruchttwijgje.** Dit is ± 10—15 cm lang en bezit aan het eind een spoor. Niet snoeien.

6e. **Het gekroonde vruchttwijgje.** Een twijgje van dezelfde lengte, doch aan het eind een gemengde knop. Niet snoeien.

7e. **De houttwijg.** Alle organen langer dan ± 15 cm rekenen we tot de houttwijgen. Wordt op 2 goed ontwikkelde knoppen gesnoeid. Uit die knoppen kunnen voortkomen:

a. 2 sporen,

b. 2 gemengde knoppen,

c. of 2 hout- of 2 vruchttwijgen,

d. uit de bovenste knop een vrucht- of houttwijg, uit de onderste knop een spoor.

Dit laatste komt het meest voor. Vruchttwijg niet snoeien, houttwijg in de volgende winter op 1 goed ontwikkelde knop. Bij c wordt in de zomer reeds de bovenste houtscheut verwijderd, de onderste wordt in de volgende winter op 2 knoppen gesnoeid. Aan de vruchttwijgen doen we niets.

a en b laat men ongesnoeid.

Het verlengde (verlengenis) van een snoer, of gesteltak ener palmet, moet tot op 20—30 cm worden ingesnoeid.

Onze Leibomen zijn onberispelijk.

ZOMERSNOEI.

Wanneer in de winter een houttwijg op 2 knoppen is gesnoeid, kunnen zich daaruit 2 houtscheuten ontwikkelen, zie c. In begin Juni of eerder wordt de bovenste verwijderd, ± twee weken later wordt de onderste op 4—6 bladeren genepen. Op iedere vruchthoutzetel wordt slechts 1 houtscheut toegelaten, welke, zoals aangegeven, wordt genepen (afgesneden). Gedurende de gehele zomer heeft scheutdunnen en nijpen plaats, steeds indien zulks nodig is.

Doel van de zomersnoei is de korte organen zoveel mogelijk in het zonlicht te plaatsen, zodat de bladeren dezer organen krachtig kunnen assimileren.

Scheutjes korter dan ± 15 cm worden niet genepen, evenmin de verlengenissen.

Staande snoeren, zowel appelen als peren zijn ideale vormen voor kleine tuinen. Plantafstand 0.60 M.-1 M.

PRUIMEN.

Beauty. Amerikaanse pruim. Vrucht matig groot, kleur lichtrood. Iets later rijp dan June Blood. Goede smaak. Kaspruim.	Eind Juli
Belle de Louvain. Sterk groeiende, goed vruchtbare boom. Draagt vroeg. Grote eivormige, blauwe pruim van tamelijk goede kwaliteit. Zeer goede marktpruim.	Pluktijd 1e helft September
Bangertse Blauwe (Ongeduldige). Vrij grote, langwerpige blauwe pruim. Smaak goed. Ondervindt weinig hinder van nachtvorst. Boom groeit krachtig en gezond.	2e helft Augustus
Coe's Golden Drop. Eigenaardig gevormde, grote vrucht; geel van kleur met enkele rode stipjes. Is alleen als leiboom of struikvorm aan te bevelen op een warme plaats. Geeft dan heerlijk smakende vruchten. Draagt overvloedig.	Eind Sept.
Czar. Boom groeit sterk. Is zeer vruchtbaar. De blauwe vruchten, welke middelmatig groot zijn, hebben een fraai uiterlijk en smaken behoorlijk.	Begin Aug.
Drap d'Or d'Esperen. Vruchten met een aangename zoete smaak. Hoogronde, aan de zonzijde gele, dikwijls met een wit-blauw waas bedekte, grote vrucht. Boom groeit zeer sterk en is zeer vruchtbaar.	1e helft September

	Pluktijd
Doyenné. Wordt in vele streken Dubbele Boerenwit genoemd. Vruchten zijn bijna niet van elkander te onderscheiden. Kleur doorschijnend geel. Heerlijk zoet van smaak en saprijk. Vormt een matig grote boom, is vroeg vruchtbaar. Blad groter en donkerder groen dan van Dubb. Boerenwit, bladrand dieper ingesneden. Bovendien zijn de scheuten behaard.	Laatst Aug.
Dubbele Boerenwit. Een der lekkerste pruimen; tamelijk groot, aan leibomen groot. Mooie wasgele, doorschijnende kleur. Boom groeit matig, doch is erg vruchtbaar. Bladeren tamelijk rond en min of meer groen-geel gemarmerd. Scheuten glad. In elk opzicht zeer aan te bevelen.	Aug.-Sept.
Eldense Blauwe (Early Rivers). Boom wordt matig groot. Vrucht iets langwerpig, klein, blauw, vruchtvlees goudgeel, matig van smaak. Draagt rijk, ook reeds op jeugdige leeftijd.	Begin Aug.
Early Laxton. Vruchten zijn bleek-rood gekleurd, middelmatig van smaak en niet groot. De boom blijft klein, draagt rijk.	Begin Aug.
Golden Japan. Amerikaanse pruim. Boom gezond en zeer vruchtbaar, bloeit vroeg. De bleekgele vruchten zijn zeer groot en goed van kwaliteit. Uitmuntende kaspruim.	Begin Aug.
Kirke's. Een der lekkerste blauwe pruimen. Groot en rond, met een waslaag bedekt. Boom groeit goed, maar draagt onregelmatig. Als bezwaar zij aangemerkt, dat de vruchten bij ongunstig weder gauw barsten. Mag in geen particuliere tuin ontbreken.	September

	Pluktijd
Kwets, Blauwe. Langwerpige, zoete vrucht. Vruchtbare, goed groeiende boom.	September
Kroosjespruim. Kleine ronde, geel-rose, met rose stippen overdekte vrucht. Draagt in jaren met weinig nachtvorst zeer rijk. Smaak gewoon.	Eind Juli
Ontario. Grote, langwerpige ronde, goudgele vrucht. Smaak goed. Gelijkt op Reine Claude d'Oullins. Groeit sterk. Vruchtbaarheid goed.	Begin Aug.
Rode Eierpruim (Cataloniëpruim). Goed groeiende boom, welke langwerpige lichtrode vruchten geeft; smaak is matig. Gewilde marktvrucht. Eist warme standplaats.	September
Reine Claude Boddaert. Geeft zeer grote vruchten met een geel-groene kleur, rood gespikkeld. Heerlijk zoet vruchtvlees. Eist echter een warme standplaats. Boom groeit goed en is vruchtbaar. Voldoet op enkele buitenplaatsen in kassen zeer goed.	Half Sept.



Belle de Louvain — Dubb. Boerenwit — Kirke's

Kroonboompjes Fay's New Prolific

	Pluktijd
Reine Victoria. Mooie, grote, eivormige, lichtrode vrucht. Sappig vruchtvlees. Boom groeit goed en is buitengewoon vruchtbaar, zo zelfs, dat meerdere malen gedund moet worden; want indien men te veel laat hangen, oogst men smakeloze vruchten.	Eind Aug. Begin Sept.
Reine Claude d'Althann. De grote vruchten zijn bruinrood met blauwe dauw en enigszins langrond van vorm. Vruchtvlees is donker goudkleurig. Smaak is zeer goed. Boom groeit flink, vormt een mooie kroon, is vruchtbaar en draagt vrij geregeld. Het jonge hout is metaalblauw van kleur.	September
Reine Claude d'Oullins. Grote, sappige, gele vrucht. Zeer sterk groeiende boom. Fijn van smaak. Een der beste pruimen. In enkele streken als jonge boom onvruchtbaar, doch daarna een zeer goede geregelde drager.	Half Aug.
Rode Reine Claude d'Oullins. Lichtrode vruchten, welke in ieder opzicht gelijk zijn aan Reine Claude d'Oullins, waarvan het een sport is.	Half Aug.
Reine Claude verte (Groene). De inmaakpruim bij uitnemendheid. Dit neemt echter niet weg, dat ze ook als dessertvrucht een eerste plaats inneemt. Het is een kleine, groen-gele ronde vrucht. Boom groeit goed en draagt vroeg. Eist krachtige grond en beschutte standplaats.	September
Ruth Gerstetter. De middelmatig grote, ronde vruchten zijn rood-blauw van kleur, sappig en zoet smakend. Het vruchtvlees is los van de steen. Boom groeit goed en draagt vroeg.	Half Juli
Tonneboer. Gele, ovaalvormige vruchten. Groei en vruchtbaarheid uitstekend. Neemt bijna elke standplaats voor lief.	Eind Sept.
Vroege blauwe Wijnpruim. Een der vroegste pruimen, matige kwaliteit en middelmatig groot. Boom draagt rijk.	Begin Aug.



Leiboom Golden Japan.

Om van pruimen een goede oogst te verkrijgen, is het nodig meerdere variëteiten bij elkander te plaatsen. Deze var. zijn dus **zelfsteriel,** of onvruchtbaar voor eigen stuifmeel.

Er zijn echter ook **zelffertiele** variëteiten, welke zeer goed alleen kunnen staan, al zal men waarschijnlijk nooit van een absolute zelffertiliteit mogen spreken, daar ook deze voor vreemd stuifmeel dankbaar zijn.

Volgens verschillende onderzoekers zijn de volgende variëteiten **zelffertiel, kunnen dus alleen geplant worden:** Reine Victoria, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Boddaert, Belle de Louvain, Dietrich Uhlhorn, Tonneboer, Ontario, Czar, Ruth Gerstetter.

Onderstaand een lijstje van zelfsteriele variëteiten met enige bestuivers.

Zelfsteriel. **Mogen dus niet alleen geplant worden.**	**Bestuivers**
Kirke's	Reine Claude Reine Victoria
Doyenné	Rode Eierpruim Tonneboer R. Cl. d'Oullins (soms)
Dubbele Boerenwit	Rode Eierpruim R. Cl. d'Oullins R. Cl. d'Althann (soms) Reine Claude (soms) Reine Victoria
Reine Claude d'Althann	Reine Victoria R. Cl. d'Oullins Reine Claude
Washington	Reine Victoria R. Cl. d'Oullins
Reine Claude	R. Cl. d'Oullins Kirke's Tonneboer Reine Victoria R. Cl. d'Althann Washington
Jefferson	Reine Victoria Kirke's
Drap d'Or d'Esperen	Reine Claude Reine Victoria
Eldense Blauwe	Reine Victoria R. Cl. d'Oullins Jefferson
Early Laxton	Reine Victoria
Golden Japan	June Blood Beauty
June Blood	Golden Japan

Reine Victoria.

Reine Claude d'Althann.

Bangertse Blauwe.

Opgegeven pluktijden zijn bedoeld voor buiten, in koude kassen valt dit tijdstip 3 tot 4 weken eerder.

PERZIKEN.

	Pluktijd
Amsden. Zeer goed groeiende boom, welke rijk draagt en mooi gekleurde vruchten geeft van matige kwaliteit. Vruchtvlees laat niet los van de steen.	Laatste helft Juli
Dubbele Montagne. Kleur der vrucht is geel-wit, aan de zonzijde rood. Geeft grote tot zeer grote vruchten, welke soms 3 ons zwaar kunnen worden. De smaak is uitstekend, volgens velen de lekkerste perzik. Vruchtvlees is wit, van de steen loslatend. Boom groeit goed, doch moet steeds gezwaveld worden tegen „'t wit". In elk opzicht een aanbevelenswaardige perzik, ook voor kassen.	September
Greta Jonker. Zeer vruchtbare, goed groeiende boom. Geelachtige vrucht met zacht-rode kleur. Middelmatig groot. Smaak goed. Steen los.	Juli-Aug.

	Pluktijd
Gloire Lyonnaise. Smaak der vruchten uitstekend, groot, karmijnrood. Boom groeit en draagt goed. Niet los van de steen.	Laatst Aug.
Grosse Mignonne. Eerste kwaliteit perzik. Grote, mooi gekleurde vrucht. Los van de steen. Warme standplaats nodig.	Eerste helft Sept.
Juliana (Musser). Middelmatig grote vrucht, mooi rood, goed van smaak. Vruchtvlees wit, niet los van de steen.	Half Aug.
La France. Goede vruchtbare variëteit. Vruchten groengeel met matig rode kleur. Steen los. Fijn van smaak.	Half Aug.
Lady Palmerston. Vrucht groot, geel gekleurd met rode blos. Sappig, oranje-geel vruchtvlees. Sterke groei. Vruchtbaarheid goed.	Half Aug.
Précoce de Canada (High's Early Canada). Uitstekende perzik. Grote, donkerrood getekende vrucht. Los van de steen. Beste variëteit voor kassen en buiten.	Laatst van Juli
Peregrine. Een perzik met een zeer goede smaak. Steen los. De vrucht is groot, bleekgroen van kleur met sterke blos. Boom groeit goed en is vruchtbaar. Voldoet ook in kassen zeer goed.	Laatst Augustus
Sea Eagle. Zeer grote, citroengele vrucht, een weinig rood. Smaak goed, vooral onder glas. Steen los. Goede gezonde groei, alsmede goede vruchtbaarheid zijn kenmerken dezer variëteit.	Sept.-Oct.
Waterloo. Zeer goede vroege perzik, welke grote, mooie rode, tot donkerrode vruchten geeft. Steen niet los.	Half Juli
Wilder. Mooi rood gekleurde, grote, lekkere vrucht. Vruchtvlees los van de steen.	Begin Aug.

Onze perzikbomen zijn alle op de echte kroosjespruim geoculeerd, welke voor ons klimaat de beste is. De onderstammen worden door ons zelf gekweekt en steeds nauwkeurig geïnspecteerd, wat vooral met het oog op loodglansziekte beslist noodzakelijk is; dit laatste geldt ook voor de pruimen.

Précoce de Canada.

AALBESSEN.

Maarse's Prominent. Nieuwe rode bes. Zie voor beschrijving bij de kleurplaat.

Fay's New Prolific. Zeer grote rode bes. Door zijn vroege bloei nogal last van nachtvorsten. Laat snoeien.

Hoornse Geelsteel. Heerlijk zoete bes. Groter dan Rode Geelsteel.

Witte Geelsteel. De zoetste bessen, daarom de beste voor dessert. Vrucht niet groot.

Losdorper. Goede, vrij grote, rode bes; kan ook heel lang hangen.

Laxton's Perfection. Zeer grote rode bessen. Bijzonder lange trossen.



Kwee du Portugal, vrucht van een 3-jarige struik.

Jhr. van Tets. Sterke groeier. Zeer grote trossen en bessen. Gelijkt op Fay's New Prolific en schijnt hier en daar beter te bevallen dan deze. Is enkele dagen eerder rijp. Lang snoeien.

Goliath. Grootvruchtige, zwarte bes. Een der beste voor de grootcultuur.

Roodknop. Een selectie uit de „Goliath". Middelmatig lange tros. Stevige, matig grote bes. Zeer vruchtbaar, zet gemakkelijk. Plukt minder lastig dan „Goliath".

Boskoop Giant (Hoogendijks Seedling). Grootvruchtige zwarte bes.

Baldwin. Kleine struik. Zeer vruchtbaar. Tros matig lang. Even later rijp dan Goliath.

Davidson's Eight. Vormt eveneens een kleine struik. Zeer vruchtbaar. Tros als van Goliath en meestal gelijktijdig rijp.

Daniels September. Zeer grote zwarte bes aan flinke trossen, laat rijp. Struiken groeien sterk en zakken gemakkelijk uit elkaar.

Rosenthal's Langträubige. Nieuwe zwarte bes. Grootvruchtige, vroege var. Groeit zeer sterk en is rijkdragend.

Silvergieter's Zwarte. Vormt een flinke struik. Steilgroeiende takken met rode knoppen. Grote tros.

Wellington XXX. Is een goede drager. Grote trossen alsmede grote zwarte bessen. Min of meer liggende groei.

Kroonboompjes stamlengte 0.80—1.10 m. *Gemakkelijk plukken!*

Snoeren

Variëteiten: Fay's New Prolific en Jhr. van Tets.

KRUISBESSEN.

Crown Bob. Grote ovaalronde, rode bes. Harig.

Engelse Witte. Grote, groen-witte, gladde vruchten.

Ruige Gele. De beste gele kruisbes. Middelmatig groot.

Winham's Industry. Grote ronde, karmijnrode, harige vruchten.

Bessen worden direct na het planten tamelijk kort ingesneden. Wanneer in de herfst wordt geplant, snoeit men in Dec.-Jan. tot op ongeveer 30 cm in, wat in het voorjaar wordt geplant, zelfs tot 15 cm en korter. Het voordeel hiervan is, dat een zwaar gewas zich ontwikkelt, zodat stevige struiken worden gevormd. Indien de lange twijgen der struiken niet worden gesnoeid of althans onvoldoende, zullen ze bijna niet groeien, en heeft men er ook in de toekomst weinig genoegen van. In tegenstelling met goed gesnoeide bessen zullen trossen en vruchten klein blijven.

Plantafstand voor rode en witte bessen 1.50—2 m, voor zwarte bessen 2.50—3 m, voor kruisbessen 1.50 m. Op lichte zandgrond kunnen deze maten wat kleiner zijn.

Ziekten en insecten.
Alle bessen in Januari bespuiten met 7½ % opl. van **vruchtboomcarbolineum** o.a. tegen de bessenspruitvreter en tegen bladluizen, waarvan de eitjes op het jonge hout overwinteren.

Tegen **rupsen en bastaardrupsen** spuit men bij de eerste verschijning reeds met een ½ % opl. van **loodarsenaat.** Zeer vroeg in 't voorjaar verschijnen de eerste bastaardrupsjes al, dit zijn larven van de bessenbladwesp. In de bloeitijd der bessen spuiten met een opl. van 2 % bariumchloride in plaats van loodarsenaat (dan geen bijenvergiftiging).

Indien in de zwarte bessen **rondknoppen** voorkomen, dan in 't voorjaar spuiten met **8 % Californische pap,** als de blaadjes zo groot zijn als een cent, bij voorkeur op een milde dag. Goliath is uiterst gevoelig en verdraagt geen 8 %. Hiervoor niet meer dan 5 % gebruiken.

Tegen **bladvalziekte** spuit men alle bessen in Maart-April en begin Augustus of eerder, indien de vruchten geplukt zijn, met **1 % Bordeauxse pap.**

Kruisbessenmeeldauw (Amerik.) voorkomt men door een bespuiting in begin Mei en begin Juni met **Alcalische Bourgondische pap,** te bereiden uit 1.5 kg sodex + 1.5 kg kopervitriool + 100 l. water.

FRAMBOZEN.

Malling Promise . . . . Rijkdragend. Lichtrode, kegelvormige vruchten, fris van smaak. **Preussen** . . . . Extra grote vruchten, goed van smaak en vast. Zeer krachtige groeier.	*f* 3.— per 10 *f* 25.— per 100

De afstand waarop men frambozen plant is op de rij 30 cm, tussen de rijen 1.50 m—1.75 m.

Wordt in het voorjaar geplant, dan **insnoeien** tot op ± **40 cm,** de in de herfst geplante tot op **1 m.**

Direct na de oogst **oude takken** bij de grond afknippen en verbranden, 3—4 jonge scheuten per plant sparen, deze geven het volgend jaar vruchten.

Tegen de **larve der frambozenkever** (frambozenwormpje) spuit men direct na de hoofdbloei met een opl. van **Derris,** wat nog 1—2 maal wordt herhaald, met een tussenruimte van 8 dagen. Het percentage Derris is afhankelijk van het rotenongehalte en wordt door de leverancier vermeld. I.p.v. Derris kan men ook D.D.T. gebruiken.

In Januari spuiten met 7½ % opl. van **vruchtboomcarbolineum,** tegen de rode worm, zeer overvloedig sproeien.

Frambozen prefereren varkensmest.

AARDBEIEN.

Hieronder aangeboden planten zijn alle verspeend en met zorg gekweekt, hebben dus een sterk wortelgestel. Ze kunnen daarom niet eerder dan in Sept. worden geleverd en zijn geschikt om de gehele winter door geleverd te worden; met onverspeende planten zou dit minder goed gaan. Planten, welke voor bak- of kascultuur moeten dienen, kunnen met extra zware kluiten geleverd worden.

Auchincruive Climax. Gewonnen door Mr. Read op het West-of Scotland College en in 1947 in de handel gebracht. De plant groeit sterk, bossig, groot donkergroen blad, krachtige uitlopers. De kwaliteit der middelmatig tot grote, donkerrode, conische vruchten met rose vruchtvlees is goed; zaden verzonken, dop klein.

Bowa. Vrucht middelvroeg, zeer groot, goed van smaak. Rijke drager. Is een verbetering van Mme Moutôt.

Spuit Uw aardbeien enige dagen voor de bloei met **1.5% Bordeauxse pap** en herhaal dit in 't laatst van Juli, begin Aug. nog eens.

Deutsch Evern. Een der beste vroege aardbeien, zowel buiten als onder glas. Extra gekweekte planten kunnen zeer grote vruchten leveren. Geforceerde planten, vooral onder plat glas, geven veelal in de herfst nog weer een aardige opbrengst. De smaak is geurig. Ze draagt rijk.

Ydun. Een nieuwe variëteit. Iets langwerpige, grote vruchten, met helderrode kleur. Smaak goed. Rijpt 1 week later dan Deutsch Evern. De planten groeien sterk en dragen rijk. Op goede grond ruim planten.

Jucunda. De meest bekende handels-aardbei. Is op sommige gronden niet aan te bevelen, omdat de smaak dan wel eens min of meer bitter kan zijn. 't Is de laatste aardbei.

Madame Lefèbre. Een zeer goede, vroege aardbei, groot van stuk, helderrood van kleur en niet te zoet. Geschikt om te forceren. Zeer gezocht voor jambereiding.

Mme Moutôt. De grootste aardbei, nog al vast en donkerrood. Wordt in enkele streken in 't groot aangeplant. Kwaliteit matig.

Sensation (Mizzi Schindler). Een middelmatig grote, ronde vrucht, met een verrukkelijk zoete, op frambozen gelijkende smaak. Kleur glanzend donkerrood. Draagt overvloedig. Wordt tot de late variëteiten gerekend.

Strooi, als de bloei ten einde loopt, tussen Uw aardbeien een dun laagje stro of dennennaalden. U oogst dan altijd schone vruchten. Geef direct na de oogst 75 gram A.S.F. korrels per m^2., in de verhouding 12 × 15 × 18. Niet op de bladeren strooien.

DRUIVEN.

Worden in elke gewenste variëteit geleverd.

RABARBER.

KERSEN.

Earley Rivers (Duitse kers).

Grote, donkerode vrucht, welke ± een week voor de Meikers rijp is. Wordt in de Betuwe veel aangetroffen.

Früheste der Mark.

De allervroegste.

Meikers.

De beste van alle kersen. Deze Meikers is absoluut de goede, dus geen minderwaardig onderras.

Napoleon (Spaanse knapkers).

Zeer grote, rose vrucht. Prima van smaak.

Varikse zwarte.

Een der beste zwarte kersen. Boom wordt groot, is vruchtbaar, doch zelfsteriel. Early Rivers is een der goede bestuivers, is zelf dankbaar voor het stuifmeel van Varikse zwarte.

Vroege v. d. Wetter.

Zeer vroege kers.

Wijnkers (Platter).

Zeer grote, donkerrode, sappige vrucht. Smaak prima. Scheurt niet bij regen. Eén der beste late kersen. Zeer grote boom.

MORELLEN.

ABRIKOZEN.

Struikvormen

Vroege of Trosoranje	
Hongaarse	Bredase
Moorpark	Royal

NOTEN.

Walnoot (Okkernoot). Hoogstam kroonbomen.
Corylus avellana. Gewone hazelnoot.
Corylus avellana atropurpurea. Bruinbladige hazelnoot.

JAPANSE WIJNBES.

Deze plant geeft vruchten met een frisse, zoet-rinse smaak; hebben veel overeenkomst met bramen, doch de kleur is helderrood. Sierlijke plant, geschikt voor muurbedekking.

AMERIKAANSE BRAAM.

Vruchten groter dan van de gewone braam. Door hun sterke groei voor kleine tuinen ongeschikt. Bij het planten zeer kort insnijden, daarna laten groeien.

MISPEL.

KWEEPEREN.

Struiken.
Champignon, Kwee du Portugal,
Schone van Bolwiller.

VIJG.

Sterke struiken.

Bevalt U deze catalogus, geeft hem dan ter inzage aan Uw vrienden en kennissen.
Wordt ook op aanvrage gaarne gratis toegezonden.

Laxton's Superbe

Nieuwe rode bes „Maarse's Prominent"

Ongeveer 25 jaar geleden begon de Heer J. Maarse, fruitkweker te Schellinkhout (N.H.), aan zijn eerste kruisingen met rode bessen, met het doel een betere variëteit te verkrijgen dan de bekende en tot nu toe meest gekweekte Fay's New Prolific. Zo ontstond uit een kruising van Prolific × onbekende rode bes de variëteit Jhr. van Tets, welke inmiddels grote bekendheid verkreeg, maar niet het doel was van de Heer Maarse. In 1947 kruiste hij Jhr. van Tets met Prolific en werden de daarvan afkomstige zaden in 1948 uitgezaaid. Uit dit zaaisel kwam de gewenste bes naar voren, welke in elk opzicht een verbetering bleek te zijn van de Prolific.

Deze nieuwe bes „Maarse's Prominent" werd in de onmiddellijke nabijheid van andere rode bessen, Prolific en Jhr. van Tets, geplant als onderbeplanting van halfstam appels en peren om een goede vergelijking mogelijk te maken. De omstandigheden waren dus gelijk. Vanaf 1952 hebben wij „Maarse's Prominent" steeds gecontroleerd, niet alleen de oorspronkelijke struik, maar ook het daarvan gekweekte materiaal, dat uitsluitend in onze kwekerij aanwezig is.

De groei der jonge struiken is gelijk aan of iets minder dan van Prolific, later echter aanmerkelijk beter, in verband waarmede de plantafstand 50 cm ruimer genomen moet worden. Ook bij een volle dracht groeit de struik goed door. Knoploosheid komt bij „Maarse's Prominent" niet voor. Het blad is donkergroen en gelijkt op het blad van Jhr. van Tets. De struiken groeien stevig en de scheuten waaien niet af. De vruchtbaarheid is zeer goed en kan niet beter. De lengte van de trossen is als van de Prolific, het korrelvrije deel van de steel iets langer en daarom gemakkelijker te plukken. De glimmende, helderrode, stevige korrels (vruchten) zijn even groot als van Prolific, de smaak is beslist beter, geuriger. In houdbaarheid won „Maarse's Prominent" het van de Prolific, dit kwam in de zomer van 1956 zeer duidelijk uit. De struiken lopen enige dagen later uit dan Prolific, dit is ten opzichte van het nachtvorstgevaar een groot voordeel. Ook dit voorjaar had de struik in de tuin van de Heer Maarse merkbaar minder nachtvorstschade dan de omringende struiken.

„Maarse's Prominent" is een eerste klasse tafelbes, welke èn door de consument èn door de handel hoog gewaardeerd zal worden. Wij willen ons daarom gaarne belasten deze bes bij U te introduceren.



FIRMA E. R. DE WILDE

ROZEN EN VRUCHTBOMEN

BUSSUM

Prijslijst 1957-1958

ATTENTIE!

Bijgaande catalogus s.v.p. zorgvuldig bewaren.

Kwekerijen en kantoor Koedijklaan 25, Bussum Telefoon 02959-2710

Giro No. 76661

VERKOOPCONDITIES

Bestellingen worden zoveel mogelijk naar volgnummer uitgevoerd. Het is daarom wenselijk, zo vroeg mogelijk te bestellen. In de drukke verzendtijd is het dikwijls niet mogelijk alle orders direct uit te voeren.

Levering per spoor geschiedt franco station N.-Bussum; per bodedienst franco bodehuis te Bussum.

Verzending. De goederen reizen voor **rekening en risico** van de koper. Gelieve bij bestelling de wijze van verzending of (en) verlangde route nauwkeurig op te geven; anders kiezen wij de weg, die ons het meest geschikt en voordeligst voorkomt.

Soorten en variëteiten. Voor de echtheid daarvan wordt ingestaan. Men wordt verzocht bij de bestelling te vermelden, of een ontbrekende of uitverkochte variëteit mag worden vervangen door een meest nabijkomende, anders zullen wij dit ongevraagd doen.

Verpakking. Hieraan wordt de uiterste zorg besteed. Het verpakkingsmateriaal wordt voor de **kostende prijs** in rekening gebracht en in **geen geval teruggenomen.**

Garantie voor de hergroei **kan niet** worden gegeven. Een uitzondering maken we voor grote beplantingen, welke door ons of onder ons toezicht worden uitgevoerd. Gewassen, welke niet zijn aangeslagen, worden in dit geval door andere vervangen. Verpakkings-, transport- en plantingskosten zullen daarvoor in rekening worden gebracht. **Evenwel wordt geen enkele vergoeding verstrekt, in welke vorm ook, indien door weersomstandigheden de planten schade ondervinden of dood gaan.**

Prijzen, in deze catalogus vermeld, zijn vrijblijvend.

Voor het buitenland zijn de prijzen 20% hoger.

Bij het verschijnen van deze catalogus vervallen prijzen, in vroegere catalogussen vermeld.

Korting op het bedrag wordt nimmer toegestaan.

Voor het onderhoud van tuinen wordt **geen** personeel beschikbaar gesteld.

Betaling. Men wordt beleefd verzocht kleine bedragen na ontvangst der in orde bevonden zijnde goederen per postwissel of per post-giro No. 76661 over te maken. **Alle facturen zijn invorderbaar 1 maand na dato, zonder korting en met verhoging der incassokosten.**

Bij eventuele betaling per postwissel of per post-giro, gelieve men het reçu als kwitantie te beschouwen.

Annulering. Bij annulering van een order door koper moet door hem 30% schadevergoeding worden betaald.

Als het bestelde eenmaal is gerooid, kan daarin niets meer worden gewijzigd.

Kosten, voortvloeiende uit het weigeren van een zending, zijn voor rekening van koper, hieronder vallen ook emballage en inpakkosten.

Klachten worden, indien daar aanleiding voor bestaat, binnen acht dagen na ontvangst der planten ingewacht. Nadien wordt door ons daarvan geen nota meer genomen.

Iedere koper erkent door het verstrekken van een opdracht de bovenstaande voorwaarden als voor hem rechtsgeldend.

PRIJSLIJST

Grootbloemige rozen

	Prijs p. stuk	Vanaf 25 stuks p. stuk
Armonia	*f* 1,70	*f* 1,60
Angelita Ruaix	„ 1,70	„ 1,60
Albast	„ 1,70	„ 1,60
Alaska	„ 1,70	„ 1,60
BUCCANEER	„ 2,50	„ 2,25
BEAUTÉ	„ 3,25	„ 3.—
Bravo	„ 1,70	„ 1,60
BAYADÈRE	„ 4.—	„ 3,75
BURNABY	„ 4.—	„ 3,75
BIG DADDY	„ 4.—	„ 3,75
BINGO	„ 4.—	„ 3,75
Chief Seattle	„ 1,70	„ 1,60
Charles Mallerin	„ 1,70	„ 1,60
Capistrano	„ 1,70	„ 1,60
Candleglow	„ 1,70	„ 1,60
Condesa di Sastago	„ 1,70	„ 1,60
Crimson Glory	„ 1,70	„ 1,60
Cromatella	„ 1,70	„ 1,60
CHRYSLER IMPERIAL	„ 2,50	„ 2,25
Diamond Jubilee	„ 1,70	„ 1,60
DETROITER	„ 2,50	„ 2,25
DOWNLAND LUSTRE	„ 4.—	„ 3,75
DUO	„ 4.—	„ 3,75
ETHEL SANDAY	„ 4.—	„ 3,75
Etoile de Hollande	„ 1,70	„ 1,60
Ena Harkness	„ 1,70	„ 1,60
EUGENIO FOJO	„ 2,25	„ 2.—
First Love	„ 1,70	„ 1,60
Fanny Blankers-Koen	„ 1,70	„ 1,60
FAVORITA	„ 4.—	„ 3,75
FRIVOLITÉ	„ 4.—	„ 3,75
Fred Howard	„ 1,70	„ 1,60
GOLDEN REVELRY	„ 3.—	„ 2,75
GAY LADY	„ 4.—	„ 3,75
HENRI FORD	„ 4.—	„ 3,75
HENRI MALLERIN	„ 3,25	„ 3.—
HANDSOM RED	„ 3,50	„ 3,25
JOSEPHINE BRUCE	„ 4.—	„ 3,75
Julia	„ 1,70	„ 1,60
Karl Herbst	„ 1,70	„ 1,60
Kath. T. Marschall	„ 1,70	„ 1,60
Katharina Pechtold	„ 1,70	„ 1,60

	Prijs p. stuk	Vanaf 25 stuks p. stuk
LA GRACIEUSE	„ 4,50	„ 4.—
Lady Sylvia	„ 1,70	„ 1,60
LOVE SONG	„ 4.—	„ 3,50
LONDON PRIDE	„ 4.—	„ 3,50
Marcelle Gret	„ 1,70	„ 1,60
Minerve	„ 1,70	„ 1,60
MEDITERRANEA	„ 2,50	„ 1,70
Mayet	„ 2.—	„ 1,75
MARDI GRAS	„ 3.—	„ 2,75
Margaret	„ 3,50	„ 3,25
Mission Bells	„ 1,70	„ 1,60
MIGUEL ALDRUFEU	„ 4.—	„ 3,75
Mrs. Sam Mac Gredy	„ 1,70	„ 1,60
New Yorker	„ 1,70	„ 1,60
Opéra	„ 1,70	„ 1,60
ORANGE SCEPTER	„ 2,50	„ 2,25
Paramount	„ 1,70	„ 1,60
PAGEANT	„ 3.—	„ 2,75
Peace	„ 1,70	„ 1,60
PIGMY RED	„ 4.—	„ 3,75
Printemps	„ 1,70	„ 1,60
PINK PERFUME	„ 4.—	„ 3,75
Pres. Herbert Hoover	„ 1,70	„ 1,60
PRES. EISENHOWER	„ 3.—	„ 2,75
Profusion	„ 1,70	„ 1,60
Pierre	„ 1,70	„ 1,60
QUEEN ELISABETH	„ 3,50	„ 3,25
QUEEN OF BERMUDA	„ 4,25	„ 4.—
RIDGEWAY	„ 4.—	„ 3,75
Rosalia	„ 1,70	„ 1,60
REGINALD FERNYHOUGH	„ 3,50	„ 3,25
Souv. de Jacques Verschuren	„ 1,70	„ 1,60
SATMIR	„ 4.—	„ 3,75
Serenade	„ 1,70	„ 1,60
SKYLON	„ 3.—	„ 2,75
Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus	„ 1,70	„ 1,60
Spek's Yellow	„ 1,70	„ 1,60
Sutter's Gold	„ 1,70	„ 1,60
Suzon Lothé	„ 1,70	„ 1,60

	Prijs p. stuk	Vanaf 25 stuks p. stuk
TAMARISK	„ 4.—	„ 3,75
THE QUEEN	„ 3,50	„ 3,25
TONGA	„ 4.—	„ 3,75
TIFFANY	„ 3,50	„ 3,25
TANGER	„ 2,50	„ 2,25
Taurinia	„ 1,70	„ 1,60
Texas Centennial	„ 1,70	„ 1,60
Virgo	„ 1,70	„ 1,60
Volcano	„ 1,70	„ 1,60

Polyantharozen

AMY	*f* 4.—	*f* 3.75
Alain	„ 1,70	„ 1,60
Betty Prior	„ 1,70	„ 1,60
Donald Prior	„ 1,70	„ 1,60
Elisabeth Hassefras	„ 1,70	„ 1,60
Else Poulsen	„ 1,70	„ 1,60
Farida	„ 1,70	„ 1,60
Fashion	„ 1,70	„ 1,60
Floradora	„ 1,70	„ 1,60
Frensham	„ 1,70	„ 1,60
Fru Inge Poulsen	„ 1,70	„ 1,60
Gaudia	„ 1,70	„ 1,60
GERTRUD WESTPHAL	„ 2,25	„ 2.—
Goldilocks	„ 1,70	„ 1,60
Holländerin	„ 2.—	„ 1,75
Independence	„ 1,70	„ 1,60
JIMINY CRICKET	„ 3,50	„ 3,25
Kirsten Poulsen	„ 1,70	„ 1,60
LULLABY	„ 4.—	„ 3,75
Masquerade	„ 1,70	„ 1,60
MA PERKINS	„ 2,50	„ 2,25
MAGRANA	„ 3.—	„ 2,75
MISTY GOLD	„ 4.—	„ 3,75
NYMPH	„ 3.—	„ 2,75
Orange Triumph	„ 1,70	„ 1,60
OBERON	„ 4.—	„ 3,75
ORANGE SWEETHEART	„ 2,50	„ 2,25
POLLY PRIM	„ 3,50	„ 3,25
Paul Grampel	„ 1,70	„ 1,60
Pinocchio	„ 1,70	„ 1,60
SANDRINGHAM	„ 4.—	„ 3,75
SIREN	„ 1,70	„ 1,60
VENUS	„ 3,50	„ 3,25
Vogue	„ 1,70	„ 1,60

Klimrozen

Albertine	*f* 2,75
American Pillar	„ 2,75
Blaze	„ 2,75
Bonn	„ 2,75
CLIMBING ENA HARKNESS	„ 5.—
Climbing Etoile de Hollande	„ 2,75
Climbing General Mac Arthur	„ 2,75
Climbing Katharina Pechtold	„ 2,75
Climbing Mme Edouard Herriot	„ 2,75
CLIMBING NEW YORKER	„ 3,25
Climbing Orange Triumph	„ 2,75
CLIMBING PEACE	„ 5.—
Climbing Texas Centennial	„ 2,75
CORAL DAWN	„ 4.—
Dorothy Perkins	„ 2,75
Dr. W. van Fleet	„ 2,75
Excelsa	„ 2,75
FLAMING SUNSET	„ 5.—
Gloire de Dyon	„ 2,75
Golden Climber	„ 2,75
Guinée	„ 2,75
New Dawn	„ 2,75
Paul's Scarlet Climber	„ 2,75
PINK CLOUD	„ 3,25
PARADE	„ 4.—
Rochester	„ 2,75
White Dorothy	„ 2,75
Zéphérine Drouhin	„ 2,75

Miniatuurroosjes

„ 1,70

Stamrozen

„ 6.—

Treurrozen

„ 9.—

Botanische- en Parkrozen

	Zware planten	„ 2,25
Rosa canina:		
per stuk	f 0,50	
éénjarige per 100 stuks	„ 18.—	
tweejarige per 100 stuks	„ 40.—	
tweejarige per 1000 stuks	„ 125.—	
Rosa rubiginosa:		
per stuk	„ 0,50	
éénjarige per 100 stuks	„ 18.—	
tweejarige per 100 stuks	„ 40.—	
tweejarige per 1000 stuks	„ 125.—	

FRUITBOMEN

Appels

	Per stuk
Hoogstam kroonbomen prijs hangt af van variëteit en maat	f 8.— tot f 15.—
Halfstam kroonbomen prijs hangt af van variëteit en maat	„ 7.— tot „ 15.—
Eenjarige Loten	„ 2,50
Struikvormen	„ 4.— tot „ 7.—
Struikvormen extra zware	„ 8.— tot „ 20.—
Staande snoeren	„ 5.— tot „ 15.—
Liggende snoeren	„ 6.— tot „ 10.—
Liggende tweezijdige snoeren	„ 7,50 tot „ 12,50
Waaiervormen	„ 15.—
Waaiervormen zware	„ 20.— tot „ 30.—
U-vorm	„ 10.— tot „ 20.—
Palmetten met vlakliggende en schuine takken	„ 15.—
Palmet candelaber	„ 15.—
Palmetten met vlakliggende en schuine takken met vruchthout	„ 20.— tot „ 30.—
Palmet candelaber, bezet met vruchthout	„ 20.— tot „ 30.—

Extra zware bomen, prijs per correspondentie.

Peren

Hoogstam kroonbomen, prijs hangt af van variëteit en maat	„ 9.— tot „ 15.—
Halfstam kroonbomen, prijs hangt af van variëteit en maat	„ 8.— tot „ 15.—
Struikvormen	„ 4,50 tot „ 8.—
Struikvormen extra zware	„ 9.— tot „ 20.—
Staande snoeren	„ 5.— tot „ 15.—
Liggende snoeren	„ 6.— tot „ 10.—
Liggende tweezydige snoeren	„ 10.— tot „ 12,50
Waaiervormen	„ 15.—
Waaiervormen zware	„ 20.— tot „ 30.—
U-vorm	„ 10.— tot „ 20.—
Palmetten met vlakliggende en schuine takken	„ 15.—
Palmet candelaber	„ 15.—
Palmetten met vlakliggende en schuine takken met vruchthout	„ 20.— tot „ 30.—
Palmet candelaber, bezet met vruchthout	„ 20.— tot „ 30.—

Extra zware bomen, prijs per correspondentie.

Per stuk

Pruimen

Hoogstam kroonbomen	*f* 8.— tot *f* 15.—
Halfstam kroonbomen	„ 7.— tot „ 15.—
Struikvorm	„ 4,50 tot „ 8.—
Struikvorm extra zwaar	„ 9.— tot „ 20.—
Leibomen	„ 15.—
Leibomen zwaar	„ 20.— tot „ 30.—

Extra zware bomen, prijs per correspondentie.

Perziken

Leibomen	„ 20.— tot „ 25.—
Leibomen, halve	„ 10.— tot „ 15.—
Struikvormen	„ 10.—
Kroonbomen	„ 15.— tot „ 20.—

Aalbessen

Zware struiken	per stuk *f* 1,25	
	per 100 „ 90.—	
Kroonboompjes		„ 3.— tot „ 4.—
Snoeren	per stuk „ 2,50	
	per 10 st. „ 22,50	

Kruisbessen

Struiken	„ 1,25 en „ 1,50
Kroonboompjes	„ 4.— en „ 5.—

Frambozen

per 10 stuks „ 3.—
per 100 „ „ 25.—

Aardbeien

per 10 stuks „ 2.50—
per 100 „ 20.—

Druiven

per stuk „ 4.—

Rabarber (Paragon)

per stuk „ 1.—
per 100 stuks „ 75.—

Kersen

Hoogstammen	„ 6.— tot „ 15.—
Halfstammen	„ 6.— tot „ 15.—
Leibomen	„ 15.— tot „ 25.—
Struikvormen	„ 4.— tot „ 7,50

Morellen

Leibomen	„ 15.— tot „ 20.—
Halfstam kroonbomen	„ 6.— tot „ 12,50
Struikvormen	„ 4.— tot „ 8.—

		Per stuk
Abrikozen		
Struikvormen		„ 5.— tot „ 7,50
Amandel		
Struiken		„ 8.—
Hoogstammen		„ 12,50
Noten		
Walnoot. Hoogstam kroonbomen		per stuk „ 12.50 tot „ 20.—
„ geënt, veren		per stuk „ 10.— tot „ 15.—
Corylus avellana (Gewone Hazelnoot)		ƒ 2.— per stuk
Corylus avellana atropurpurea		„ 2.— „ „
Japanse Wijnbes		
		„ 2,25 „ „
Amerikaanse Braam		
		„ 2,25 „ „
Mispel		
Halfstammen	per stuk ƒ 6.—	
Struiken	„ „ „ 4.—	


NAAR A'DAM
STATION
NAARDEN-BUSSUM
LIGGING KWEEKERY
WILLEMSLAAN
KOEDYKLAAN
HEEREN-STRAAT
LAAN
KERK
STRAAT
BRINK
HUIZERWEG
NAAR LAREN
KWEEKERY
BREEDELAAN
HILVERSUMSCHE WEG
NAAR H'SUM
N

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)